

TÖBB MAKROELEMET TARTALMAZÓ, FOLYÉKONY SZERVETLEN TRÁGYA - NEM MIKROBIÁLIS NÖVÉNYI BIOSTIMULÁNS NPK mikroelem-tartalmú ásványi trágya, 7-0-28

(% w/v)
14,1 % ÖSSZES NITROGÉN (N)
7,0 % Karbamid-nitrogén.
28 % KÁLIUM-OXID (K₂O) Vízben oldható.

Alacsony klórtartalmú.

Mikroelemekkel dúsított teljesen vízben oldódó: 0,008 % Bór (B), nátrium formájában / 0,001 % Réz (Cu), kelátképző anyag: EDTA / 0,014 % Vas (Fe), kelátképző anyag: EDTA / 0,007 % Mangán (Mn), kelátképző anyag: EDTA / 0,001 % Molibdén (Mo), nátrium formájában / 0,003 % Cink (Zn), kelátképző anyag: EDTA.

A jelenlévő kelátok stabilitását biztosító pH-tartomány: Cu 1,5-10, Fe 1,5-6,5, Mn 3-10, Zn 2-10.

ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC LICHID COMPUS CU MACROELEMENTE - BIOSTIMULATOR NEMICROBIAN AL PLANTELOR Îngrășământ mineral cu oligoelemente NPK, 7-0-28

(% w/v)
7 % AZOT (N) TOTAL
7,0 % Azot ureic.
28 % OXID DE POTASIU (K₂O) Solubil în apă.

Cu conținut scăzut de clor.

Oligoelemente sunt complet solubile în apă: 0,008 % Bor (B), ca sodiu / 0,001 % Cupru (Cu), chelat cu EDTA / 0,014 % Fier (Fe), chelat cu EDTA / 0,007 % Mangán (Mn), chelat cu EDTA / 0,001 % Molibden (Mo), ca sodiu / 0,003 % Zinc (Zn), chelat cu EDTA.

Intervalul de pH pentru a garanta stabilitatea chelaților prezenți: Cu 1,5-10, Fe 1,5-6,5, Mn 3-10, Zn 2-10.

SAMMENSAT FLYDENDE UORGANISK MAKRONÆRINGSSTOFGØDNING - IKKEMIKROBIEL BIOSTIMULANT TIL PLANTER NPK mineralisk gødning med mikronæringsstoffer, 7-0-23.2

(% w/v)
7 % TOTAL NITROGEN (N)
7,0 % Ureakvælstof.
23.2 % KALIUM (K) Vandopløseligt.

Med et lavt chloridindhold.

Mikronæringsstoffer er fuldstændigt vandopløselige: 0,008 % Bor (B), som natrium / 0,001 % Kobber (Cu), chelateret med EDTA / 0,014 % Jern (Fe), chelateret med EDTA / 0,007 % Mangán (Mn), chelateret med EDTA / 0,001 % Molybdæn (Mo), som natrium / 0,003 % Zink (Zn), chelateret med EDTA.

pH-område, der garanterer acceptabel stabilitet af den chelaterede fraktion: Cu 1.5-10, Fe 1.5-6.5, Mn 3-10, Zn 2-10.

Fysisk form: løsning.

Bestanddele: Trikaliumcitrat [866-84-2]¹; Urea [57-13-6]¹.
¹: Stoffer og blandinger af jordbrugsrelige materialer.

SAMMENSATT FLYTENDE UORGANISK MAKRONÆRINGSGJØDSEL - IKKE-MIKROBIELL BIOSTIMULANT NPK mineralgjødsel med mikronæring, 7-0-23.2

(% w/v)
7 % TOTALNITROGEN (N)
7,0 % Ureanitrogen.
23.2 % KALIUM (K) Vannløselig.

Lavt kloridinnhold.

Mikronæringsstoffene er fullstendig vannløselige: 0,008 % Bor (B), som natrium / 0,001 % Kobber (Cu), kelatert med EDTA / 0,014 % Jern (Fe), kelatert med EDTA / 0,007 % Mangán (Mn), kelatert med EDTA / 0,001 % Molybden (Mo), som natrium / 0,003 % Sink (Zn), kelatert med EDTA .

pH-område som garanterer akseptabel stabilitet for den kelaterte fraksjonen: Cu 1.5-10, Fe 1.5-6.5, Mn 3-10, Zn 2-10.

Fysisk form: løsning.

Bestanddeler: Trikaliumsitrát [866-84-2]¹; Urea [57-13-6]¹.
¹: Stoffer og blandinger av jordbrukelige materialer.

Denne gødning indeholder urea, som kan frigive ammoniak og påvirke luftkvaliteten. Afhængigt af de lokale forhold skal der træffes passende afhjælpende foranstaltninger.

Anvisning for påtænkt anvendelse, herunder anvendelsesmængde: Anvendes i doser på 20-50 L/ha (fortyndet i 300-1000 L vand) til greens, sportsbaner og udendørsbaner eller rekreative græsarealer. Produktet kan anvendes fra maj til november. For at opnå de bedste resultater bør produktet anvendes til blad- eller rotoptagelse som en del af et planlagt gødningsprogram.

Anvendelse af Greenmaster Liquid Advance High K forbedrer næringsstofudnyttelsen af N og toleransen over for tørkestress. Kontakt venligst producenten eller vores lokale distributør for specifikke anbefalinger. www.icl-group.com.

EUH210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Fysisk form: løsning.

Bestanddele: Trikaliumcitrat [866-84-2]¹; Urea [57-13-6]¹.
¹: Stoffer og blandinger af jordbrugsrelige materialer.

MONIRAVINTEINEN NESTEMÄINEN EPÄORGAANINEN PÄÄRAVINNELANNOITE - EI-MIKROBIPOHJAINEN KASVIBIOSTIMULANTTI NPK hivenravinteita sisältävä kivennäislannoite, 7-0-23

(% w/v)
7 % KOKONAISTYYPPI (N)
7,0 % Ureatyyppi.
23.2 % KALIUM (K) Vesiliukoinen.

Vähäklloorinen.

Hivenravinteita ovat täysin vesiliukoisia: 0,008 % Boori (B), natriumina / 0,001 % Kupari (Cu), kelatoitu EDTA Ila / 0,014 % Rauta (Fe), kelatoitu EDTA Ila / 0,007 % Mangaani (Mn), kelatoitu EDTA Ila / 0,001 % Molybdeeni (Mo), natriumina / 0,003 % Sinkki (Zn), kelatoitu EDTA Ila.

ilmoitettava ne pH-arvot, joissa kelatointuneen aineen hyväksyttävä stabiiliisuus on taattu: Cu 1.5-10, Fe 1.5-6.5, Mn 3-10, Zn 2-10.

Fyysinen muoto: liuoksena.

Ainesosilla: Trikaliumsitraatti [866-84-2]¹; Urea [57-13-6]¹.
¹: Ensimmäisluokan koostuvat aineet ja seokset.

Gödselmedlet innehåller urea, som kan släppa ut ammoniak och påverka luftkvaliteten. Beroende på lokala förhållanden ska lämpliga saneringsåtgärder vidtas.

Anvisningar för avsedd användning, inbegripet givor: Appliceras i doser på 20–50 L/ha (utspätt i 300–1000 L vatten) på greener, idrottsplaner och utomhusplaner eller gräsmattor. Produkten kan användas från maj till november. För bästa resultat bör produkten appliceras för blad- eller rotupptagning som en del av ett planerat gödslingsprogram.

Greenmaster Liquid Advance High K förbättrar näringsupptagningen av kväve och toleransen mot torka. Kontakta tillverkaren eller vår lokala distributör för specifika rekommendationer. www.icl-group.com.

EUH210: Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Fysisk form: lösning.

Beståndsdelar: Trikaliumcitrat [866-84-2]¹; Urea [57-13-6]¹.
¹: Råvaruämnen och råvarublandningar.

Tämä lannoite sisältää ureaa, josta voi vapautua ammoniakkia ja joka voi vaikuttaa ilman laatuun. Olosuhteista riippuen on toteutettava asianmukaiset korjaavat toimenpiteet.

Käyttötarkoitusta koskevat ohjeet, mukaan lukien käyttömäärät: Levitetään 20–50 L/ha (laimennettuna 300–1000 L veteen) viheralueille, urheilukentille ja ulkokentille tai virkistysalueiden nurmikoille. Tuotetta voidaan käyttää toukokuusta marraskuuhun. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi tuote tulisi levittää lehtien tai juurien imeytymiseksi osana suunniteltua lannoitusohjelmaa.

Greenmaster Liquid Advance High K -tuotteen käyttö parantaa tyyppiravinteiden käyttötehokkuutta ja kuivuusstressinsietokykyä. Ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjäämme saadaksesi tarkkoja suosituksia. www.icl-group.com.

EUH210: Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Fyysinen muoto: liuoksena.

Ainesosilla: Trikaliumsitraatti [866-84-2]¹; Urea [57-13-6]¹.
¹: Ensimmäisluokan koostuvat aineet ja seokset.

GREENMASTER® LIQUID ADVANCE High K

AU / NZ
DE / AT / CH / LU
DK
ES
FI
FR / BE / CH / LU
GB / IE
HR
HU
IT
NL / BE
NO
PL
PT
RO
SE / FI

FERTILISER - NPK Fertiliser with trace elements, for foliar application, 5-0-20

(% w/v)
5 % TOTAL NITROGEN (N)
5.0 % Ureic nitrogen.
20 % POTASSIUM OXIDE (K₂O) Water soluble.

Low in chloride.

Trace elements are completely water soluble:
0.006 % Boron (B) / 0.001 % Copper (Cu), chelated by EDTA / 0.010 % Iron (Fe), chelated by EDTA / 0.005 % Manganese (Mn), chelated by EDTA / 0.001 % Molybdenum (Mo) / 0.002 % Zinc (Zn), chelated by EDTA.

Impurities:
Biuret (maximum): 1.09 g/kg N.
Mercury (Hg): 0.90 mg/kg.

WARNING: Do not swallow. The spray from this product may act as an irritant. Avoid inhalation and contact with the eyes and skin. This product contains heavy metal impurities. Its use may result in accumulation of mercury in the soil and may lead to residue levels in plant and animal products in excess of the maximum level specified by the Australia New Zealand Food Standards Code. Users are encouraged to seek further advice. *This label complies with the National Code of Practice for Fertilizer Description and Labelling.*

Manufacturer:
Everris International B.V.
Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD Heerlen
The Netherlands.
Tel: +31 (0)45-56 09 100

Emergency Telephone Number: +44 1235 239 670 (24/7)
Non-Emergency Telephone Number: +31 (0) 418 655 700



(R106108125A)
3171



COMPOUND LIQUID INORGANIC MACRONUTRIENT FERTILISER -
NON MICROBIAL PLANT BIOSTIMULANT
NPK mineral fertiliser with micronutrients, 7-0-28 / 7-0-23.2

(% w/v)
7 % TOTAL NITROGEN (N)
7,0 % Ureic nitrogen.
28 % POTASSIUM OXIDE (K₂O) (= 23.2 % K) Water soluble.

Poor in chloride.

Micronutrients are completely water soluble:
0.008 % Boron (B), as sodium / 0.001 % Copper (Cu), chelated by EDTA / 0.014 % Iron (Fe), chelated by EDTA / 0.007 % Manganese (Mn), chelated by EDTA / 0.001 % Molybdenum (Mo), as sodium / 0.003 % Zinc (Zn), chelated by EDTA.

pH range guaranteeing acceptable stability of the chelated fraction:
Cu 1.5-10, Fe 1.5-6.5, Mn 3-10, Zn 2-10.

IE
This fertiliser contains urea, which can release ammonia and have an impact on air quality. Depending on local conditions, appropriate remediation measures must be taken.

Instructions for intended use, including application rates:
Applied at rates of 20-50 L/ha (diluted in 300-1000 L water) to greens, sportsitches & outfields or amenity turf. The product can be used May–November. For the best results the product should be applied for foliar or root uptake as part of a planned fertilizing program.

Greenmaster Liquid Advance High K applications improves the nutrient use efficiency of N and the tolerance to drought stress. Contact the manufacturer or our local distributor for specific recommendations. www.icl-group.com.

EUH210: Safety data sheet available on request.

Physical form: solution.

Ingredients: Tripotassium citrate [866-84-2]¹;
Urea [57-13-6]¹.
¹: Virgin material substances and mixtures.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY.
Repacking not allowed without written approval from the manufacturer.
CAUTION: Keep out of reach of children and pets.
Protect from Frost.

Distributed by:
AU/NZ: Everris Australia Pty Ltd.,
211/33 Lexington Drive, Bella Vista,
NSW 2153. Tel: +61 2 8801-3300.

EU-Emergency Telephone Number:
+44 1235 239 670 (24/7)
Non-Emergency Telephone Number:
+31 (0)418 655 700

AU-Emergency Telephone Number:
02 8014 4558 (24/7)
NZ-Emergency Telephone Number:
09 929 1483 (24/7)

Country of Origin: Great Britain



SAMENGESTELDE VLOEIBARE ANORGANISCHE MACRONUTRIËNTENMESTSTOF -
NIET-MICROBIËLE BIOSTIMULANT VOOR PLANTEN
NPK minerale meststof met micronutriënten, 7-0-28

(% w/v)
7 % TOTAAL STIKSTOF (N)
7,0 % Ureumstikstof.
28 % KALIUMOXIDE (K₂O) In water oplosbaar.

Chloorarm.

Micronutriënten volledig oplosbaar in water:
0,008 % Boor (B), als natrium / 0,001 % Koper (Cu), gecheleerd door EDTA / 0,014 % IJzer (Fe), gecheleerd door EDTA / 0,007 % Mangaan (Mn), gecheleerd door EDTA / 0,001 % Molybdeen (Mo), als natrium / 0,003 % Zink (Zn), gecheleerd door EDTA.

pH-bereik voor gegarandeerde stabiliteit van de aanwezige chelaten: Cu 1,5-10, Fe 1,5-6,5, Mn 3-10, Zn 2-10.

Bestanddelen: Trikaliumcitraat [866-84-2]¹;
Ureum [57-13-6]¹.
¹: Stoffen en mengsels als primair materiaal.

BE / NL
Deze meststof bevat ureum, dat ammoniak kan uitstoten en de luchtkwaliteit kan beïnvloeden. Afhankelijk van de lokale omstandigheden moeten passende saneringsmaatregelen worden genomen.

Instructies voor het beoogde gebruik, met inbegrip van de doseringen: Toepassing in doseringen van 20-50 L/ha (verdund in 300-1000 L water) op greens, sportvelden en buitenvelden of recreatiegras. Het product kan worden gebruikt van mei tot november. Voor het beste resultaat moet het product worden toegepast voor opname via het blad of de wortels als onderdeel van een gepland bemestingsprogramma.

Greenmaster Liquid Advance High K toepassingen verbeteren de efficiëntie van het gebruik van stikstof en de tolerantie voor droogtestress. Neem contact op met de fabrikant of met onze lokale distributeur voor specifieke aanbevelingen. www.icl-group.com.

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Fysieke vorm: oplossing.

Bestanddelen: Trikaliumcitraat [866-84-2]¹;
Ureum [57-13-6]¹.
¹: Stoffen en mengsels als primair materiaal.

FLÜSSIGES ANORGANISCHES MEHRNÄHRSTOFF-
MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL -
NICHT-MIKROBIELLES PFLANZEN-BIOSTIMULANS
Mineralisches Düngemittel mit Spurennährstoffen, NPK, 7-0-28

(% w/v)
7 % GESAMTSTICKSTOFF (N)
7,0 % Carbamidstickstoff.
28 % KALIUMOXID (K₂O) Wasserlöslich.

Chloridarm.

Spurennährstoffe sind vollständig wasserlöslich:
0,008 % Bor (B), als Natrium / 0,001 % Kupfer (Cu), als Chelat von EDTA / 0,014 % Eisen (Fe), als Chelat von EDTA / 0,007 % Mangan (Mn), als Chelat von EDTA / 0,001 % Molybdän (Mo), als Natrium / 0,003 % Zink (Zn), als Chelat von EDTA.

pH-Wert Bereich, um die Stabilität vorhandener Chelate zu gewährleisten: Cu 1,5-10, Fe 1,5-6,5, Mn 3-10, Zn 2-10.

Dieses Düngemittel enthält Harnstoff, der Ammoniak freisetzen und sich auf die Luftqualität auswirken kann. Je nach den örtlichen Gegebenheiten sind geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen.

Anweisungen zum vorgesehenen Anwendungszweck, einschließlic
Aufwandmengen: Anwendung in Dosierungen von 20–50 L/ha (verdünnt in 300–1000 L Wasser) auf Grünflächen, Sportplätzen und Außenfeldern oder Zierrasenflächen. Das Produkt kann von Mai bis November angewendet werden. Für beste Ergebnisse sollte das Produkt im Rahmen eines geplanten Düngungsprogramms zur Aufnahme über die Blätter oder Wurzeln angewendet werden.

Die Anwendung von Greenmaster Liquid Advance High K verbessert die Nährstoffverwertungseffizienz von Stickstoff und die Toleranz gegenüber Trockenstress. Für spezielle Empfehlungen nehmen Sie bitte Verbindung auf mit dem Hersteller oder mit unseren ortsansässigen Vertriebspartnern. www.icl-group.com.

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Physikalische Form: Lösung.

Hinweis: Düngemittel ohne Ammoniumnitrat, keine Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung erforderlich.

Inhaltsstoffe: Trikaliumcitrat [866-84-2]¹;
Harnstoff [57-13-6]¹.
¹: Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen.

CONCIME INORGANICO LIQUIDO COMPOSTO A BASE DI
MACROELEMENTI -
BIOSTIMOLANTE NON MICROBICO DELLE PIANTE
Concime minerale NPK con microelementi, 7-0-28

(% w/v)
7 % AZOTO (N) TOTALE
7,0 % Azoto ureico.
28 % OSSIDO DI POTASSIO (K₂O) Idrosolubile.

A basso tenore di cloruro.

Microelementi completamente solubili in acqua:
0,008 % Boro (B), nella forma di sodio / 0,001 % Rame (Cu), chelato con EDTA / 0,014 % Ferro (Fe), chelato con EDTA / 0,007 % Manganese (Mn), chelato con EDTA / 0,001 % Molibdeno (Mo), nella forma di sodio / 0,003 % Zinco (Zn), chelato con EDTA.

Intervallo di pH per garantire la stabilità dei chelati presenti: Cu 1,5-10, Fe 1,5-6,5, Mn 3-10, Zn 2-10.

Forme physique: solution.

Ingédients: Citrato de tripotassio [866-84-2]¹;
Urea [57-13-6]¹.
¹: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo.

DE / AT / CH
Anweisungen zum vorgesehenen Anwendungszweck, einschließlic
Aufwandmengen: Anwendung in Dosierungen von 20–50 L/ha (verdünnt in 300–1000 L Wasser) auf Grünflächen, Sportplätzen und Außenfeldern oder Zierrasenflächen. Das Produkt kann von Mai bis November angewendet werden. Für beste Ergebnisse sollte das Produkt im Rahmen eines geplanten Düngungsprogramms zur Aufnahme über die Blätter oder Wurzeln angewendet werden.

Die Anwendung von Greenmaster Liquid Advance High K verbessert die Nährstoffverwertungseffizienz von Stickstoff und die Toleranz gegenüber Trockenstress. Für spezielle Empfehlungen nehmen Sie bitte Verbindung auf mit dem Hersteller oder mit unseren ortsansässigen Vertriebspartnern. www.icl-group.com.

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Physikalische Form: Lösung.

Hinweis: Düngemittel ohne Ammoniumnitrat, keine Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung erforderlich.

Inhaltsstoffe: Trikaliumcitrat [866-84-2]¹;
Harnstoff [57-13-6]¹.
¹: Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen.

ABONO INORGÁNICO LÍQUIDO COMPUESTO A BASE DE
MACRONUTRIENTES -
BIOESTIMULANTE DE PLANTAS NO MICROBIANO
Abono mineral NPK con micronutrientes, 7-0-28

(% w/v)
7 % NITRÓGENO (N) TOTAL
7,0 % Nitrógeno ureico.
28 % ÓXIDO DE POTASIO (K₂O) Hidrosoluble.

Pobre en cloro.

Micronutrientes completamente solubles en agua:
0,008 % Boro (B), como sodio / 0,001 % Cobre (Cu), quelado por EDTA / 0,014 % Hierro (Fe), quelado por EDTA / 0,007 % Manganeso (Mn), quelado por EDTA / 0,001 % Molibdeno (Mo), como sodio / 0,003 % Zinc (Zn), quelado por EDTA.

Intervalo de pH para el que se garantiza la estabilidad de los quelatos presentes es: Cu 1,5-10, Fe 1,5-6,5, Mn 3-10, Zn 2-10.

Forma física: solución.

Ingredientes: Citrato tripotásico [866-84-2]¹;
Urea [57-13-6]¹.
¹: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes.

ADUBO INORGÂNICO COMPOSTO LÍQUIDO DE
MACRONUTRIENTES -
BIOESTIMULANTE NÃO MICROBIANO PARA PLANTAS
Adubo mineral com micronutrientes NPK, 7-0-28

(% w/v)
7 % AZOTO (N) TOTAL
7,0 % Azoto ureico.
28 % ÓXIDO DE POTÁSSIO (K₂O) Solúvel em água.

Pobre em cloro.

Micronutrientes completamente solúveis em água:
0,008 % Boro (B), sob a forma de sódio / 0,001 % Cobre (Cu), quelatado por EDTA / 0,014 % Ferro (Fe), quelatado por EDTA / 0,007 % Manganês (Mn), quelatado por EDTA / 0,001 % Molibdénio (Mo), sob a forma de sódio / 0,003 % Zinco (Zn), quelatado por EDTA.

Intervalo de pH para garantir a estabilidade dos quelatos presentes: Cu 1,5-10, Fe 1,5-6,5, Mn 3-10, Zn 2-10.

Forma física: solução.

Ingredienti: Citrato de tripotassio [866-84-2]¹;
Urea [57-13-6]¹.
¹: Substâncias e misturas à base de matérias vírgens.

ES
Este abono contiene urea, que puede liberar amoniaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctoras apropiadas.

Instrucciones de uso, incluida la dosis de aplicación:
Se aplica a dosis de 20-50 L/ha (diluido en 300-1000 L de agua) en campos de golf, campos deportivos y campos al aire libre o césped ornamental. El producto se puede utilizar entre mayo y noviembre. Para obtener los mejores resultados, el producto debe aplicarse por vía foliar o radicular como parte de un programa de fertilización planificado.

Las aplicaciones de Greenmaster Liquid Advance High K mejoran la eficiencia en el uso de los nutrientes del nitrógeno y la tolerancia al estrés por sequía. Póngase en contacto con el fabricante o con nuestro distribuidor en su zona para recibir recomendaciones específicas. www.icl-group.com.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Forma física: solución.

Ingredientes: Citrato tripotásico [866-84-2]¹;
Urea [57-13-6]¹.
¹: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes.

WIEŁOSKŁADNIKOWY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ
MAKROSKŁADNIKOWY -
BIOSTYMULATOR NIEMIKROBIOLOGICZNY
NPK nawóz mineralny zawierający mikroskładniki pokarmowe, 7-0-28

(% w/v)
7 % AZOT CAŁKOWITY (N)
7,0 % Azot amidowy.
28 % TLENEK POTASU (K₂O) Rozpuszczalny w wodzie.

Poor in chloride.

Z mieszaniną mikroskładników pokarmowych całkowicie rozpuszczalnych w wodzie: 0,008 % Bor (B), w postaci sodu / 0,001 % Miedź (Cu), schelatowany przez EDTA / 0,014 % Żelazo (Fe), schelatowany przez EDTA / 0,007 % Mangan (Mn), schelatowany przez EDTA / 0,001 % Molibden (Mo), w postaci sodu / 0,003 % Cynk (Zn), schelatowany przez EDTA.

Zakres pH gwarantujący stabilność obecnych chelatów: Cu 1,5-10, Fe 1,5-6,5, Mn 3-10, Zn 2-10.

Składniki: Cytrynian tripotasu [866-84-2]¹;
Mocznik [57-13-6]¹.
¹: Pierwotne surowce i mieszaniny.

PL
Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Instrukcje dotyczące zastosowania, w tym dawki:
Stosować w dawkach 20–50 L/ha (rozcieńczone w 300–1000 L wody) na trawniki, boiska sportowe i pola zewnętrzne lub trawniki rekreacyjne. Produkt można stosować od maja do listopada. Aby uzyskać najlepsze wyniki, produkt należy stosować w ramach planowanego programu nawożenia, podając go dolistnie lub do korzeni.

Zastosowanie preparatu Greenmaster Liquid Advance High K poprawia efektywność wykorzystania azotu i tolerancję na stres suszy. Aby uzyskać konkretne zalecenia, należy skontaktować się z producentem lub naszym lokalnym dystrybutorem. www.icl-group.com.

EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Postać fizyczna: roztwór.

Składniki: Cytrynian tripotasu [866-84-2]¹;
Mocznik [57-13-6]¹.
¹: Pierwotne surowce i mieszaniny.

SLOŽENA TEKUĆA ANORGANSKA GNOJIVA S
MAKROHRANJIVIMA -
NEMIKROBNI BILJNI BIOSTIMULANSI
NPK mineralno gnojivo s mikrohranjivima, 7-0-28

(% w/v)
7 % UKUPNI DUŠIK (N)
7,0 % Amidni dušik.
28 % KALJEV OKSID (K₂O) Topiv u vodi.

Siromašno kloridom.

Mikro-hranjivihu su potpuno topivi u vodi:
0,008 % Bor (B), kao natrij / 0,001 % Bakar (Cu), kelirano EDTA / 0,014 % Željezo (Fe), kelirano EDTA / 0,007 % Mangan (Mn), kelirano EDTA / 0,001 % Molibden (Mo), kao natrij / 0,003 % Cink (Zn), kelirano EDTA.

pH raspon kojim se jamči stabilnost prisutnih keliranih tvari: Cu 1,5-10, Fe 1,5-6,5, Mn 3-10, Zn 2-10.

Agregatni oblik: otopina.

Sastojci: Trikalijev citrat [866-84-2]¹;
Urea [57-13-6]¹.
¹: Tvari i smjese iz neprerađenih sirovina.

HR
Ovo gnojivo sadržava ureu, koja može ispustiti amonijak i utjecati na kvalitetu zraka. Ovisno o lokalnim uvjetima moraju se poduzeti odgovarajuće korektivne mjere.

Upute za predviđenu namjenu, uključujući predviđene količine: Primjenjuje se u količini od 20-50 L/ha (razrijeđeno u 300-1000 L vode) na zelene površine, sportske terene i vanjska igrališta ili rekreacijske travnjake. Proizvod se može koristiti od svibnja do studenog. Za najbolje rezultate proizvod treba primijeniti folijarno ili korijenski kao dio planiranog programa gnojidbe.

Primjena Greenmaster Liquid Advance High K poboljšava učinkovitost korištenja dušika i toleranciju na stres uzrokovan sušom. Za određene preporuke obratite se tvrtki proizvođača ili našem lokalnom distributeru. www.icl-group.com.

EUH210: Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Agregatni oblik: otopina.

Sastojci: Trikalijev citrat [866-84-2]¹;
Urea [57-13-6]¹.
¹: Tvari i smjese iz neprerađenih sirovina.