



Pflanzen- schutz

NemaTrident® F



Biologischer Pflanzenschutz gegen Tipula-Larven im Rasen mit Nematoden

Produktbeschreibung

NemaTrident® F enthält die natürlich vorkommende, entomopathogen wirkende Nematodenart *Steinernema feltiae* für den Einsatz in der Sport- bzw. Golfrasenpflege und Rollrasenproduktion. Die Nematoden suchen aktiv nach Tipula Larven im Boden ab Bodentemperaturen von über 8°C und dringen in diese ein. Freigesetzte Bakterien führen zum Tod der Larven. Diese sterben ab, während sich eine neue Generation junger infektiöser Nematoden ausbildet, die nach dem Tod der Larven schlüpfen.


Tipula



Larve der Wiesenschnake
(*Tipula paludosa*)



Adult der Kohlschnake
(*Tipula oleraceae*)



Bei starkem Befallsdruck oder Befall durch die Kohlschnake, empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit dem Insektizid Acelepryn® 3-4 Wochen nach Flughöhepunkt der Adulten, gefolgt von einer Anwendung von

Nematrident F mit 50% der Aufwandmenge eine Woche danach.

Vorteile



Biologischer Pflanzenschutz mit Nematoden



Besonders für Einsatz in den Bereichen Golf, Sport und Sodenproduktion geeignet



Wirksam gegen Tipularlarven

Eigenschaften

Verpackung	500 mio Nematoden / Packung
Nematodenart	Steinernema feltiae
Wirkungsweise	Infektion durch Bakterien

Aufwandmengen

Aufwandmenge für 1 ha = 10.000 m²

10 Päckchen mit je 500 mio Nematoden in 500 – 1000 l Wasser/ha

5 Päckchen mit je 500 mio Nematoden in 500 – 1000 l Wasser/ha bei Vorbehandlung mit Acelepryn® bei starkem Befall

Anwendungshinweise

- 1 NemaTrident F ca. 20 Minuten vor Beginn des Mischvorgangs aus dem Kühlschrank nehmen.
- 2 Den Inhalt der Packung in 10-20 Liter Wasser auflösen.
- 3 5-10 Minuten lang umrühren, bis das Produkt vollständig aufgelöst ist.
- 4 Den Spritztank mit 3/4 der erforderlichen Wassermenge füllen.
- 5 NemaTrident F-Lösung hinzufügen, mit der restlichen Wassermenge auffüllen und dabei ständig umrühren.



Mischbarkeit von NemaTrident F

- NemaTrident F nicht in Tankmischung mit Düngern ausbringen.
- Die Dünger-Anwendung vor oder nach der Applikation von NemaTrident F ist unbedenklich.
- NemaTrident F ist mit den meisten Pflanzenschutzmitteln, Biostimulanzen und einigen Wetting Agents mischbar. Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren ICL Fachberater.

Hinweise

- Möglichst bald nach Erhalt ausbringen. Beachten Sie das Verfallsdatum auf der Packung!
- Niemals einfrieren, bei 4°- 8 °C lagern.
- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Auf feuchten Boden ausbringen, falls notwendig vorher wässern.
- Bodentemperaturen sollten mind. 3-4 Stunden > 8°C liegen.
- Spritzgeräte und Spritzbehälter vor der Anwendung reinigen und alle LeitungsfILTER, Düsenfilter und Siebe, die Nematoden blockieren könnten, entfernen.
- Düsen mit einem Durchmesser von mindestens 0,8 mm verwenden.
- Frühlmorgens oder abends ausbringen, wenn die Lichteinstrahlung gering ist.
- Sofort nach der Ausbringung einwässern.
- Der Boden sollte nach der Anwendung 14 Tage lang feucht gehalten werden.
- Nach Gebrauch Hände und Gesicht waschen.
- Geeignete Schutzkleidung tragen beim Anmischen und der Ausbringung.

Empfohlener Anwendungszeitraum

[illegible]

Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.

<https://icl-growingsolutions.com/de-de/turf-landscape/products/nematrident-f/>

Zuletzt aktualisiert am: 08/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. Alle Rechte vorbehalten.

