



SOLINURE®

Blau

Das Standard-Nährsalz für den Kulturstart

19 | 7 | 20 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Produktbeschreibung

Der Fertigationsdünger Solinure® Blau eignet sich ideal für den Kulturstart oder zur Regeneration nach Stress von Kulturen im gewachsenen Boden. Zur Blütenindikation oder Fruchtbildung ist das Mischen mit einem kalkhaltigen Solinure®-Produkt möglich.

Garantierte Analyse

Oxid

N	Gesamtstickstoff (N)	19%
	Nitratstickstoff (N-NO ₃)	10.9%
	Ammoniumstickstoff (N-NH ₄)	8.1%
P ₂ O ₅	Phosphorpentoxid	7%
	Wasserlösliches (P ₂ O ₅)	7%

K ₂ O	Kaliumoxid	20%
	Wasserlösliches (K ₂ O)	20%
MgO	Magnesiumoxid	2%
	Wasserlösliches (MgO)	2%
B	Bor	0.02%
	Wasserlösliches (B)	0.02%
Cu	Kupfer	0.015%
	Wasserlösliches (Cu)	0.015%
Fe	Eisen	0.08%
	Wasserlösliches (Fe)	0.08%
	EDTA-Chelat	0.05%
	DTPA-Chelat	0.03%
Mn	Mangan	0.025%
	Wasserlösliches (Mn)	0.025%
	EDTA-Chelat	0.025%
Mo	Molybdän	0.004%
	Wasserlösliches (Mo)	0.004%
Zn	Zink	0.028%
	Wasserlösliches (Zn)	0.028%

Vorteile

-  Ausgeglichene Formulierung für den Start oder die zweite Phase der Kultur
-  Hoher Mg-Gehalt für gesundes Wachstum und starke Photosyntheseleistung
-  Nitratbetonte Formulierung für schnelle Wirkung
-  Reine Rohstoffe

 Komplette Versorgung: alle Haupt- und notwendige Spurenelemente

 Qualität: ständige Prüfung der Inhaltsstoffe, Produktion und Beständigkeit

Aufwandmengen

Solinure Blau ist speziell für die Aufbauphase vor der Hauptblüte. Ausbringung: 4-5 kg/1000m² pro Woche oder 25-50kg/ha und Woche. Kontaktieren Sie Ihren ICL SF Fachberater für spezielle Anwendungshinweise.

Mengenempfehlung: 25-50 kg/ha pro Woche.

Düngen Sie zuerst eine kleine Fläche, bevor Sie die Dosierung oder andere Variablen ändern. Da die Gegebenheiten unterschiedlich sein können und die Anwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegt, kann ICL nicht für nachteilige Ergebnisse verantwortlich gemacht werden.

Anwendungshinweise

- 1 Verwenden Sie Solinure® Blau während der Startphase vor der Hauptblüte Ihrer Kultur.
- 2 Trocken lagern.
- 3 Angebrochene oder beschädigte Beutel bitte ordnungsgemäß verschließen.
- 4 Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere ICL Fachberater.

Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.

<https://icl-growingsolutions.com/de-de/agriculture/products/solinure-blue/>

Zuletzt aktualisiert am: 13/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. Alle Rechte vorbehalten.

