



SOLINURE®

Weiß



Das Standard-Nährsalz für die Fertigation während der Fruchtphase

15	5	30	3	TE
N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	

Produktbeschreibung

Der Fertigationsdünger Solinure® Weiß ist eines unser Standard-Nährsalze zur Fertigation. Solinure Weiß ist ein hochreines Produkt und einfach in der Handhabung. Die enthaltenen Spurenelemente und NPK-Analysen sind ideal für die Fertigation von Obst und Gemüse während der Fruchtphase. Die kaliumbetonte Formulierung bietet eine noch bessere Spreizung zum Stickstoffgehalt.

Garantierte Analyse

Oxid

N	Gesamtstickstoff (N)	15%
	Nitratstickstoff (N-NO ₃)	11.5%
	Ammoniumstickstoff (N-NH ₄)	3.5%
P ₂ O ₅	Phosphorpentoxid	5%
	Wasserlösliches (P ₂ O ₅)	5%

K ₂ O	Kaliumoxid	30%
	Wasserlösliches (K ₂ O)	30%
MgO	Magnesiumoxid	3%
	Wasserlösliches (MgO)	3%
B	Bor	0.024%
	Wasserlösliches (B)	0.024%
Cu	Kupfer	0.009%
	Wasserlösliches (Cu)	0.009%
	EDTA-Chelat	0.009%
Fe	Eisen	0.07%
	Wasserlösliches (Fe)	0.07%
	EDTA-Chelat	0.07%
Mn	Mangan	0.04%
	Wasserlösliches (Mn)	0.04%
	EDTA-Chelat	0.04%
Mo	Molybdän	0.004%
	Wasserlösliches (Mo)	0.004%
Zn	Zink	0.024%
	Wasserlösliches (Zn)	0.024%
	EDTA_Chelat	0.024%

Vorteile



Kalibetonte Formulierung für die Fruchtphase geeignet



Höherer Magnesiumgehalt für verbesserte Photosynthese und höhere Zuckereinlagerung



Phosphatgehalt leicht reduziert für Anwendung im Freiland oder gut phosphatversorgten Substraten

- \\ Gute Löslichkeit und staubarme Formulierung
- \\ Mit dem bekannten Spurenelementepaket
- \\ Nitratbetonte Formulierung, daher sehr gut für weiches Wasser
- \\ Hinterlässt keine Beläge auf Blättern oder Frucht bei Überkopffapplikation

Aufwandmengen

Ernte	Aufwandmenge	Zeitplan
	kg/ha/Woche	
Beerenfrüchte	20 – 30	Fruchtreifung – Ernte
Gemüse	40 – 80	Fruchtreifung – Ernte
Obstgärten/Weinberge	20 – 40	Fruchtreifung – Ernte

Mengenempfehlung: 20-40 kg/ha pro Woche.

Düngen Sie zuerst eine kleine Fläche, bevor Sie die Dosierung oder andere Variablen ändern. Da die Gegebenheiten unterschiedlich sein können und die Anwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegt, kann ICL nicht für nachteilige Ergebnisse verantwortlich gemacht werden.

Anwendungshinweise

- 1 Verwenden Sie Solinure® Weiß während der Fruchtphase.
- 2 Trocken lagern.
- 3 Angebrochene oder beschädigte Beutel bitte ordnungsgemäß verschließen.
- 4 Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere ICL Fachberater.

Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.

<https://icl-growingsolutions.com/de-de/agriculture/products/solinure-white/>

Zuletzt aktualisiert am: 13/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. Alle Rechte vorbehalten.

