



Agromaster®

12-5-20+2CaO+4MgO+
35SO₃



Készüljön fel a bőséges terméshez

12

N

5

P₂O₅

20

K₂O

2

CaO

4.0

MgO

35

SO₃

Leírás

Adjon lendületet szabadföldi vagy növényházi gyümölcs- és zöldségféléknek az Agromaster® 12-5-20+2CaO+4MgO+35SO₃ 2-3M-mal. Ez a magas káliumtartalmú NPK műtrágya hozzáadott kalciumot, magnéziumot és ként tartalmazó összetétel, 41%-ban burkolt nitrogénnel és az ICL E-Max Release technológiájával. Ez lehetővé teszi, hogy még a legkedvezőtlenebb időjárási és termesztési körülmények között is megvédje a közepes tenyészidejű növényeit a nitrogénvesztéstől.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	12%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	1.4%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	5.7%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	4.9%

P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	5%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	3.8%
K ₂ O	Kálium-oxid	20%
	Vízoldékony (K ₂ O)	20%
CaO	Kalcium-oxid	2%
	Vízoldékony (CaO)	2%
MgO	Magnézium-oxid	4%
SO ₃	Kén-trioxid	35%

Előnyök



Magas káliumtartalmú NPK műtrágya a terméshozam növeléséhez



Hozzáadott kalcium a tápanyagok jobb tárolása és szállítása érdekében



Megnövelt magnéziumtartalom a fotoszintézis fokozása érdekében

Alkalmazási javaslatok

Kultúrák	Javasolt dózis
Növényházi vagy szabadföldi zöldségfélék	
Paradicsom, paprika és tojásgyümölcs	400-800 kg/ha
Uborka, cukkini, sárgadinnye és görögdinnye	400-800 kg/ha
Vöröshagyma, fokhagyma	400-800 kg/ha
Sárgarépa és egyéb gyökérzöldségek	400-800 kg/ha

Jégsaláta	400-800 kg/ha
Talajon termesztett bogyós gyümölcsök	
Szamóca	400-800 kg/ha

A dózis, vagy bármely más körülmény megváltoztatása előtt végezzen kis felületen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 Kijuttatható kiszórással, sor- vagy ágyáskezeléssel
- 2 5-10 cm mélységben dolgozza be a talajba.
- 3 Csepegtető öntözés esetén közvetlenül a csepegtető testek alá juttassa ki.
- 4 A hatékonyság és a felvehetőség javítása érdekében kiszórás után öntözze be a területet.
- 5 Csökkentse az adagot, ha a termesztési idény második felében vízőldható műtrágyát is használ.
- 6 Tárolja száraz körülmények között.
- 7 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat megfelelően zárja le.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/agriculture/products/agromaster-12-5-202cao4mgo35so3/>

Utoljára frissítve ekkor:: 28/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. Minden jog fenntartva.

