



Osmocote® Bloom

Bloom 2-3M

Környezetbarát megoldás a virágágyai dísznövények számára

13 | 7 | 18 | 20.7 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | SO₃

Leírás

Az Osmocote® Bloom szabályozott feltáródású burkolt műtrágyával megadhatja virágágyai dísznövényeinek azt a lendületet, amellyel maximumális teljesítményt érhet el. Speciális összetétele garantálja egynyári, kiscserpes növények igényének megfelelő tápanyagellátást. A kisebb mennyiségben felhasznált műtrágya választása olyan környezetbarát döntés, amely egyúttal biztonságos, megbízható és kiváló ár-érték arányt képvisel.

Garantált összetétel

Oxid

N	Összes nitrogén	13%
	Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	5.2%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	6.9%
	Ureaformaldehide (N-MU)	0.9%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	7%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	5%

K ₂ O	Kálium-oxid	18%
	Vízoldékony (K ₂ O)	18%
MgO	Magnézium-oxid	1.5%
	Vízoldékony (MgO)	1%
SO ₃	Kén-trioxid	20.7%
B	Bór	0.018%
	Vízoldékony (B)	0.016%
Cu	Réz	0.052%
	Vízoldékony (Cu)	0.052%
Fe	Vas	0.35%
	Vas EDTA (Fe)	0.07%
Mn	Mangán	0.05%
Mo	Molibdén	0.017%
	Vízoldékony (Mo)	0.012%
Zn	Cink	0.021%

Előnyök



A 2:1:3 NPK-arány ideális a sűrű állományban nevelt virágágyai dísznövények termesztéséhez



Azonnal hasznosul, nincs szükség tápoldatozásra



Meghosszabbítja a virágágyai dísznövények polcállóságát az értékesítés során, hatása a fogyasztónál is még hosszú ideig tart.

Alkalmazási javaslatok

	Alacsony tápanyagigényű növények	Átlagos tápanyagigényű növények	Magas tápanyagigényű növények
Kiscserepes növények/egynyáriak	1,5-2 g/l	2-3 g/l	3-4,5 g/l

Figyelem! A fenti javasolt dózisok starter műtrágyát nem tartalmazó termesztőközegre vonatkoznak. A hatékonyság növelése érdekében keverjen a közeghez starter műtrágyát is, legfeljebb 0,5 kg/m³ adagban. Az Osmocote® Bloom terméket elsősorban termesztőközegbe történő bekeverésre javasoljuk – a terméket nem ajánljuk ültetőlyukba adagolásra. Bizonyos körülmények között szükség lehet vízzoldható műtrágya és/vagy a vízminőséget javító tápoldat használatára.. Részletesebb tanácsért forduljon ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadó-jához. A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Használati útmutató

- 1 Az Osmocote® Bloom az ICL Specialty Fertilizers egyedülálló gyantaburkolat-technológiájának köszönhetően szabályozott tápanyag-feltárást biztosít virágágyi dísnövényei számára.
- 2 Használja az Osmocote® Bloom terméket a rövid tenyészidejű (6 hét és 3 hónap között) virágágyi dísnövénykultúrákhoz.
- 3 Más típusú virágágyi dísnövényekhez használja az Osmocote® Exact Standard High K 3-4M vagy 5-6M terméket.
- 4 Ne tárolja 21 °C feletti hőmérsékleten, mivel ez csökkenti az Osmocote® Bloom hatástartamát. 16 °C: 3-4 hó, 21 °C: 2-3 hó, 26 °C: 1,5-2 hó.
- 5 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat mindig alaposan zárja le.
- 6 Száraz helyen tárolja.
- 7 További információért forduljon szaktanácsadó-jához.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadójához. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.

<https://icl-growingsolutions.com/hu-hu/ornamental-horticulture/products/osmocote-bloom-2-3m/>

Utoljára frissítve ekkor:: 28/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. Minden jog fenntartva.

