

BEOZ™ ACTIROOT

Raíces activas, cultivos más eficientes

Inóculo microbiano activador de la rizosfera formulado con una alta concentración *Bacillus amyloliquefaciens*

Modo de acción

Beoz® ActiRoot es un bioestimulante diseñado para potenciar el desarrollo de raíces secundarias y pelos absorbentes promoviendo sistemas radiculares con mayor superficie para el intercambio de nutrientes y agua.

Además, Beoz® ActiRoot produce enzimas y ácidos orgánicos que mejoran la disponibilidad de los nutrientes bloqueados en el suelo (P y microelementos), mejorando así la fertilidad edáfica.

La aplicación de Beoz® ActiRoot contribuye a generar rizosferas más fuertes y eficientes, que se refleja en un crecimiento más rápido y homogéneo de los cultivos, y una mayor resiliencia frente a condiciones limitantes.

Dosis recomendadas

Dosis recomendada por aplicación (g/ha): 100 g/ha.

Volumen de agua: 100-1000L

Número de aplicaciones: 1-6 según cultivo y ciclo, repetir cada 3-4 semanas tras la primera aplicación (véase tabla), y aumentar la frecuencia en épocas de máxima demanda energética y/o en situaciones de estrés (suelos encharcados, sequías, frío).

Cultivo	Nº de aplicaciones	Momento de aplicación
Extensivos (cereales, bulbos, tubérculos, remolacha, oleaginosas, proteaginosas)	1-2	En la siembra y/o durante la fase de crecimiento vegetativo, a intervalos de 3-4 semanas
Hortícolas (crucíferas, hortalizas de tallo, hortalizas de hoja, hortalizas de raíz, hortalizas de fruto, cucurbitáceas) y aromáticas	2-6	En el momento de la plantación/reanudación y luego durante la fase de crecimiento vegetativo, a intervalos de 3-4 semanas (6 para aromáticas)
Frutales y leñosos (frutales de pepita, frutales de hueso, cítricos, olivo, kiwi, vid, frutos de cáscara, arbustos frutales)	3-6	En la plantación, en la brotación y luego durante la fase de crecimiento vegetativo, a intervalos de 1 mes (6 semanas para cultivos tropicales)

Recomendaciones de uso

Producto a base de microorganismos vivos. En aplicaciones en el suelo, aplíquese a una temperatura del suelo de entre 5 y 30 °C. Aplicar el producto lo más cerca posible de las raíces, las semillas o las plántulas.

Cuando es posible, es deseable incorporar el producto en la línea de siembra. Se recomienda su aplicación con asesoramiento técnico.

www.icl-growingsolutions.com



Composición

Bacillus amyloliquefaciens,
cepa AG002/02

Contenido mínimo 5x10⁹ UFC/g

Polvo mojable (WP)

Código: S0374



Atención: Dado que las circunstancias pueden variar y la aplicación de los productos está fuera de nuestro control, ICL no se responsabiliza de ningún resultado negativo. Con esta publicación, todas las recomendaciones anteriores caducan. Antes de utilizar una nueva dosis, producto o método de aplicación, se recomienda realizar una prueba previa.