

NemaTrident F

Nematodos entomopatógenos beneficiosos para el control específico de larvas de tipula en céspedes deportivos y jardinería profesional.

Descripción

Para el control de larvas de tipula (Tipula spp.) en césped

NemaTrident F contiene el nematodo entomopatógeno beneficioso Steinernema feltiae, de origen natural, formulado en un polvo mojable y presentado en un envase no soluble en agua.

NemaTrident F ofrece un control altamente eficaz de las larvas al entrar en contacto directo con el insecto objetivo. Las larvas jóvenes de tipula (estadios iniciales) son especialmente susceptibles.

Para mejorar la movilidad de NemaTrident F en el suelo y optimizar el contacto con las larvas durante la aplicación, se recomienda utilizarlo siempre en combinación con NemaSpreader.

El exclusivo sistema de doble componente, seguro y sostenible, garantiza una dispersión máxima de los nematodos juveniles infectivos en el suelo, que posteriormente buscan activamente a las larvas para penetrarlas y eliminarlas.

Características

Envase:	Pack 5 bolsas de 500 gr/bolsa
Especie de nematodos:	Steinernema feltiae
Plaga objetivo:	Tipula ssp.
Tª mín. del suelo para aplicación;	8°C entre 3 – 6 horas por día

Dosis recomendadas

Aplicar 2.500 millones de nematodos por hectárea.

Contenido paquete NemaTrident F	Número de paquetes / ha
500 millones de nematodos	5

Atención: dado que las circunstancias pueden variar y que la aplicación de los productos se escapa de nuestro control, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Estas recomendaciones prevalecen sobre todas las indicaciones previas. Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Póngase en contacto con el distribuidor o representante de ICL de su zona o su país si desea recibir un asesoramiento más específico.

Instrucciones de uso

1. Sacar NemaTrident F del frigorífico de almacenamiento 20 minutos antes de iniciar el proceso de mezcla.
2. Disolver el producto en 10–20 litros de agua.
3. Utilizar el envase completo, ya que la distribución de nematodos no es homogénea.
4. Agitar durante 5–10 minutos hasta que el producto esté completamente disuelto.
5. Llenar el depósito del pulverizador con ¾ del volumen total de agua requerido.
6. Añadir NemaSpreader a razón de 5 litros por hectárea.
7. Incorporar la solución de NemaTrident F y completar con el resto del volumen de agua.
8. Mantener una agitación suave y constante en el depósito.
9. Pulverizar inmediatamente tras la preparación.
10. No almacenar la mezcla en el depósito más de 4 horas.

Instrucciones de aplicación de NemaTrident F

- Aplicar sobre suelo húmedo.
- Utilizar entre 500 y 1.000 litros de agua por hectárea.
- Limpiar el equipo de pulverización y el depósito antes de usar.

- Retirar todos los filtros en línea, filtros de boquilla y tamices que puedan obstruir el paso de los nematodos.
- Utilizar boquillas con un diámetro mínimo de 0,8 mm.
- Aplicar a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando los niveles de luz son bajos.
- Aplicar siempre junto con NemaSpreader a una dosis de 5 litros por hectárea.
- Irrigar inmediatamente después de la aplicación, sin saturar el suelo (usar entre 1 y 2 litros de agua por m^2).
- Mantener el suelo húmedo durante 14 días tras la aplicación.

Condiciones del suelo

- La temperatura del suelo debe ser de 8 °C o superior durante 3 a 6 horas al día para garantizar la eficacia del tratamiento.

Compatibilidad

- **No mezclar en tanque con fertilizantes**.
  La aplicación de fertilizantes antes o después de NemaTrident F es segura.
- NemaTrident F es compatible con la mayoría de pesticidas y bioestimulantes, aunque algunos pueden tener efectos negativos.
  Consulta la web de Syngenta o con tu asesor local para información detallada.
- Si el producto no es compatible, o hay dudas, aplicar 3 días antes o 14 días después de NemaTrident F.

Boquillas recomendadas

- Se pueden utilizar las boquillas Syngenta XC 08 blanca para aplicar NemaTrident F.
  Para otras boquillas, verificar que el orificio sea mayor de 0,8 mm.

Período de uso recomendado



Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

https://icl-growingsolutions.com/es-es/turf-landscape/products/nematrident/

Última actualización: 01/10/2026

ICL Growing Solutions Iberia
©2026 ICL. todos los derechos reservados.