

Fertigation

Organ 2-0-8

Una solución ecológica de primera clase

2	0	8
N	P_2O_5	K_2O

Descripción

Flecotec Organ 2-0-8 es un formulado con una relación alta en potasio, que contiene un 4 % de aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis enzimática de proteínas vegetales. El potasio cumple una función importante en el desarrollo del fruto, promotor de calidad, color, sabor y consistencia. En la elaboración de Flecotec Organ 2-0-8 se ha empleado material vegetal de origen no transgénico de alta calidad, sometido a diferentes procesos de fermentación en los que interviene la levadura Corynebacterium Melassecola.

Flecotec Organ 2-0-8 se puede utilizar en agricultura ecológica de acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Certificados para agricultura ecológica

SHC INSUMOS UNE

Análisis garantizado

Óxido

N	Nitrógeno Total	**2%**
	Nitrógeno amoniacal (N-NH_4)	0.7%
	Nitrógeno orgánico	1.3%
P_2O_5	Pentóxido de fósforo	**0%**
K_2O	Óxido de potasio	**8%**
	Soluble en agua (K_2O)	8%

Beneficios

- Rico en potasio
- Incorpora aminoácidos
- Se puede utilizar en agricultura ecológica de acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/848

Características

CE a 1 g/l:	0.35 mS/cm
pH:	5.5-6.5
Densidad (g/cc):	1.16
Envase:	Garrafa 20 L, contenedor 1000 L y cisterna a granel

Dosis recomendadas

Puede aplicar Flecotec Organ 2-0-8 a la mayoría de cultivos y suelos mediante fertirrigación con una dosis de 15-25 l/ha por aplicación en los momentos de máxima demanda de potasio.

Estas dosis recomendadas se ofrecen solo a modo orientativo, dado que las condiciones del cultivo pueden variar dependiendo de las especies cultivadas, las variedades, el agua de riego, el suelo, el clima y la salud general del cultivo. Póngase en contacto con su delegado de ICL si necesita más asesoramiento sobre dosificación.

Haga un primer ensayo o prueba a pequeña escala antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Instrucciones de uso

1. Se recomienda el uso de Flecotec Organ 2-0-8 en las etapas de máxima demanda de potasio
2. Guárdelo en un lugar seco a temperaturas entre 5 y 30 °C.
3. Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Período de uso recomendado



Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

https://icl-growingsolutions.com/es-es/agriculture/products/flecotec-organ-2-0-8/

Última actualización: 01/10/2026

ICL Growing Solutions Iberia
©2026 ICL. todos los derechos reservados.