











# Sierrablen®

## 31-5-7

La clave para el inicio de la temporada

| 31 | 5 | 7 |
|---|---|---|
| N | $P_2O_5$ | $K_2O$ |

## Descripción

Apueste por el mejor arranque posible de la temporada de crecimiento con el fertilizante mineral Sierrablen 31-5-7. Con la tecnología de encapsulado patentada por ICL, este fertilizante rico en nitrógeno es la opción idónea para un crecimiento sano y equilibrado al comienzo de la temporada de crecimiento. La mayor parte de su nitrógeno solo se libera en condiciones favorables para el crecimiento, como medio de acondicionamiento previo al estrés del césped, mientras que el resto queda inmediatamente disponible para lograr una respuesta inicial rápida, incluso con temperaturas bajas.

## Análisis garantizado

### Óxido

| | | |
|---|---|---|
| N | Nitrógeno Total | **31%** |
| | Nitrógeno amoniacal (N-$NH_4$) | 2.1% |
| | Nitrógeno ureico (N-Ur) | 28% |

| | | |
|---|---|---|
| $P_2O_5$ | Pentóxido de fósforo | **5%** |
| | Soluble en agua ($P_2O_5$) | 3.7% |
| $K_2O$ | Óxido de potasio | **7%** |
| | Soluble en agua ($K_2O$) | 7% |

## Beneficios

- Fertilizante de liberación controlada idóneo para usar al inicio de la temporada de crecimiento
- Liberación de nitrógeno dependiente de las condiciones
- Consigue una respuesta inicial rápida

## Características

**Longevidad:** 2-3 meses

**Respuesta del producto:** 10 días

**Respuesta del césped:** 7 días

## Dosis recomendadas

| | |
|---|---|
| Dosis recomendada: | 25,00 – 40,00 g/m² |

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

## Instrucciones de uso

1. Aplíquelo directamente al follaje seco.
2. Un buen riego entre las plantas después de la aplicación de este producto facilita la dispersión y potencia un efecto inmediato.
3. No lo aplique durante sequías ni heladas.
4. Se debe aplicar tras haber completado programas de aireación, como escarificación, corte o pinchado de los greenes, para evitar daños en los gránulos.
5. Cierre bien los sacos empezados o dañados.
6. Guarde el producto en un lugar seco.
7. Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

## Configuración de la abonadora

| Tipo de abonadora | Método de aplicación | Ajuste del cono | Ancho de trabajo (m) | Dosis de aplicación ($g/m^2$) | Dosis de aplicación ($g/m^2$) | Dosis de aplicación ($g/m^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25 | 30 | 35 |
| Abonadora rotativa | 1 pasada | 4 | 4,7 | Q | R 1/2 | T 1/2 |
| SR-2000 o Accupro 2000 | 2 pasadas | 4 | 4,7 | M | N | O |

### Período de uso recomendado



## Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

https://icl-growingsolutions.com/es-es/turf-landscape/products/sierrablen-31-5-7/

Última actualización: 01/10/2026

ICL Growing Solutions Iberia

©2026 ICL. todos los derechos reservados.