BEOZ MAGNUM

Impulso que marca la diferencia



BEOZ™ Magnum es un abono foliar con aminoácidos enriquecido con magnesio, zinc, boro y azufre, desarrollado para aportar nutrientes esenciales y favorecer la actividad fisiológica de los cultivos. Esta combinación permite complementar los programas de fertilización con elementos clave para el crecimiento vegetativo, la fotosíntesis y el desarrollo reproductivo de la planta. Los aminoácidos de rápida asimilación facilitan la absorción y el aprovechamiento de los nutrientes aplicados, mientras que el magnesio contribuye a una eficiente actividad fotosintética. El zinc participa en numerosos procesos metabólicos y enzimáticos relacionados con el crecimiento vegetal, el boro favorece la floración, fecundación y cuajado, y el azufre interviene en la síntesis de proteínas y en el metabolismo del nitrógeno. La acción conjunta de estos componentes ayuda a mantener cultivos más equilibrados, vigorosos y productivos.

Beneficios del producto

- Aporta aminoácidos de rápida absorción para apoyar la actividad fisiológica del cultivo.
- Complementa la nutrición con magnesio, zinc, boro y azufre.
- Favorece una actividad fotosintética eficiente y un crecimiento equilibrado.
- Contribuye a mejorar la floración, fecundación y cuajado.
- Participa en procesos relacionados con la síntesis de proteínas y el aprovechamiento del nitrógeno.
- Ayuda a mantener el vigor y el potencial productivo del cultivo.

Dosis y modo de aplicación

BEOZ™ Magnum está diseñado para aplicación foliar en cultivos leñosos, aportando aminoácidos, magnesio, zinc, boro y azufre para complementar la nutrición del cultivo durante las fases de mayor actividad fisiológica. Se recomienda su uso especialmente en los periodos de desarrollo vegetativo, floración, cuajado y recuperación postcosecha, cuando las necesidades nutricionales son más elevadas y una adecuada disponibilidad de nutrientes contribuye al correcto desarrollo del cultivo.

Cultivos	Dosis (g/Hl)	Momento de aplicación
Olivar	150-250	En primavera y otoño
Almendro	150-250	En primavera y tras recolección
Pistacho	100-200	En primavera y tras recolección
Otros cultivos leñosos	50-100	En primavera y tras recolección

**Ajustar la dosis en función del cultivo, estado fenológico y condiciones de cultivo. Asegurar una buena cobertura foliar, preferentemente en las horas de menor temperatura y radiación solar. Si es necesario, consulta con un asistente de ICL.*

Foliar Feed

Composición	**% p/p**
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua	10,0
Trióxido de azufre (SO_3) soluble en agua	29,0
Boro (B) soluble en agua procedente de ácido bórico	7,5
Zinc (Zn) soluble en agua procedente de sulfato	7,5
Aminoácidos libres de síntesis.	4,0
Nitrógeno total (N)	0,6
Nitrógeno orgánico (N)	0,6
Aminograma	
Glutámico (30%), Prolina (30%), Glicina (20%) y Arginina (20%)	
pH(1%)	4,5-5,0
Densidad	1,15 g/cc
CE (1%) mS/cm a 25ºC	3.5-3.8
Pobre en cloruro	

WS649

www.icl-growingsolutions.com

Atención: Dado que las circunstancias pueden variar y la aplicación de los productos está fuera de nuestro control, ICL no se responsabiliza de ningún resultado negativo. Con esta publicación, todas las recomendaciones anteriores caducan. Antes de utilizar una nueva dosis, producto o método de aplicación, se recomienda realizar una prueba a pequeña escala.