



STEP® Hi-Mag

Hi-Mag

Stopové prvky v mikrogranulích

0	0	0	20.0	TE
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Popis

Step-Hi-Mag doplní veškeré živiny, které Vašemu trávníku chybějí, aby mohl prospívat. Funguje rovněž jako prevence pro všechny budoucí nedostatky stopových prvků a lze je použít jako přípravu trávníku na období zátěže. Step Hi-Mag je tvořen jemnými, vysoce koncentrovanými, granulemi, které se rychle rozptylují. Má vyšší obsah hořčíku, který přispívá k lepšímu zbarvení a zlepšuje celkovou kondici trávníku. Toto hnojivo je obzvláště užitečné v oblastech s písčitou půdou, která má nízkou retenci živin v kořenové zóně. Step Hi-Mag lze snadno zahrnout do stávajících programů výživy.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	**0%**
P_2O_5	Oxid fosforečný	**0%**
K_2O	Oxid draselný	**0%**

MgO	Oxid hořečnatý	**20%**
	vodorozpustný (MgO)	10%
Cu	Měď	**0.5%**
Fe	Železo	**8%**
Mn	Mangan	**3%**
	vodorozpustný (Mn)	2%
Zn	Zinek	**1%**

Výhody

- Obsahuje všechny stopové prvky nezbytné pro řádnou výživu
- Je tvořen jemnými, vysoce koncentrovanými, granulemi; snadno se rozptýlí
- Vysoký obsah hořčíku zlepšuje zbarvení a zdravotní stav trávníku
- Vynikající v oblastech s písčitou půdou/jako příprava trávníku na období stresu
- Jednoduchá aplikace, působí až 6 týdnů

Dávkování

Doporučená dávka:	7 - 11 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

1. Aplikujte na suché listy. Pokud během 1 - 2 dní po aplikaci nezaprší, hnojivo zalijte. Závlaha napomáhá lepšímu rozptýlení granulí a na velmi nízko sečených trávnících minimalizuje riziko, že granule posbírá sekačka. Zálivka po aplikaci omezí viditelnost stop obsluhy.
2. Vyvarujte se použití za mrazu a sucha. Pokud se produkt vysype na chodník, beton, šaty apod., ujistěte se, že dojde k okamžitému odstranění, jinak hrozí nežádoucí odbarvení povrchu.
3. Odložte operace jako vertikutace a/nebo grooming až na 3. den po aplikaci; umožní to řádné rozptýlení granulí.
4. Aplikaci lze provádět v intervalu šesti týdnů.

Doporučené použití



Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/turf-landscape/products/hi-mag/

Poslední aktualizace: 05/10/2026

ICL Growing Solutions Česko a Slovensko
©2026 ICL. Všechna práva vyhrazena.