

Agroleaf® Liquid

Magnesium

Tekutá výživa pro plodiny náročné na hořčík

7	0	0	10
N	P_2O_5	K_2O	MgO

Popis

Agroleaf Liquid Magnesium je vysoce kvalitní tekuté listové hnojivo určené především k prevenci a kontrole nedostatku hořčíku. Jeho složení umožňuje široké použití na všechny typy plodin. Účinnost hnojiva ještě zvyšuje technologie F3 SurfActive. Hořčík je hlavní součástí molekuly chlorofylu a hraje klíčovou úlohu při fotosyntéze. Zvyšuje využití železa a funguje jako nosič fosforu v rostlině. Jedná se o aktivátor enzymů a současně i součást mnoha enzymů.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	**7%**
	Dusičnanový dusík (N-NO_3)	7%
P_2O_5	Oxid fosforečný	**0%**
K_2O	Oxid draselný	**0%**
MgO	Oxid hořečnatý	**10%**

vodorozpustný (MgO)	10%

Výhody

- Ideální pro nápravu a prevenci nedostatku hořčíku
- Vhodné pro širokou škálu plodin
- Lepší pokrytí, přilnavost a dostupnost živin

Dávkování

Pěstovaná plodina	Dávka (l/ha)	Mn. vody (l/ha)	Koncentrace (%)	Aplikace
Zelenina	3-6	300-600	1	Během celého cyklu sklizně 4-5krát
Brambory	3-6	250-300	1.2-2	Po odkvětu 2-3krát
Cibule, česnek	3-6	300-600	1	Po 5-6 listech, 2-3krát
Drobné ovoce, ovocné sady, vinice	3-6	600-1000	0.5-0.6	Od nasazení plodů do sklizně, 3-4krát
Obiloviny	3-6	200-300	1.5-2	2. internodium - praporcový list
Kukuřice	3-6	200-300	1.5-2	Při 8-10 listech
Řepka olejná	3-6	200-300	1.5-2	Od jara až do kvetení

* Při menším množství vody na hektar použijte nižší dávky a naopak dávky zvyšte, použijete-li větší množství vody.

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

1. Nejlepší doba pro postřik je pozdě odpoledne nebo večer. Aplikujte vysokým tlakem.
2. Lze mísit s mnoha fungicidy/insekticidy. Při mísení s dalšími chemikáliemi postřik před použitím na velké ploše nejdříve vyzkoušejte. Vyčkejte 2-3 dny na reakci.
3. Vyhněte se postřiku za nevhodných povětrnostních podmínek. (např. ostré slunce, pravé poledne s vysokými teplotami, období se silným výparem).
4. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/agriculture/products/agroleaf-liquid-magnesium-2/

Poslední aktualizace: 05/10/2026

ICL Growing Solutions Česko a Slovensko
©2026 ICL. Všechna práva vyhrazena.