



PREVENIRE LE MALATTIE

In questa stagione, i prati di microterme infeltriti sono a rischio di attacchi da *Microdochium*. Come prevenzione si consiglia di adottare il programma **SUMMER&WINTER STRESS**: la miscela aiuta a mantenere il prato sano, bello e resistente in inverno. Unisce l'azione del fungicida Heritage (aggiunto in botte) al concime fogliare Greenmaster Liquid NK e al pigmento Ryder.

Dosi per 1000 m² in 60-80 litri d'acqua:

Heritage 50 g + **Greenmaster Liquid NK** 2 l + **Ryder** 100 ml.

Sui prati di Bermuda si è ancora in tempo per intervenire contro lo Spring Dead Spot. In America si usano programmi e dosaggi molto simili a quelli descritti sopra per rinforzare le radici e mantenere il prato in salute.



RINVERDIMENTO E CONCIMAZIONE PRE-INVERNO

I prati di macroterme, soprattutto quelli soleggiati (con *Festuca a.*) con le gelate tendono ad ingiallirsi. Per prevenire il problema si può trattare con il fogliare **Vitalnova Stressbuster** + pigmento **Ryder**. Per ridurre il rischio di malattie invernali, aggiungere **Heritage** alla miscela. Dose per 1000 m² in 80 litri d'acqua: Vitalnova Stressbuster 5 l + Ryder 100 ml + Heritage 50 g.

Per rinforzare i tessuti del prato, concimare con **LandscaperPro Stress Control** 15-0-26, ricco di potassio e magnesio e con azoto a cessione controllata. Il dosaggio consigliato è di 30-35 g/m².



RISEMINE TARDIVE

A novembre, se il prato è danneggiato ed è necessario intervenire, non seminare miscugli a base di *Festuca a.*, ma utilizza **LandscaperPro Rapid**, composto da 75% di *Lolium p.*, 10% di *Poa p.* e 15% di festuche fini: consente di ottenere prati di qualità anche con il freddo ed è adatto a giardini con vari livelli di manutenzione. Dose di semina: 25-35 g/m².

Per prati a prevalenza di gramigna, la semina con **Landscaper Pro Superfast**, contenente il 100% di loietti scuri, fini e vigorosi, permette un prato verde in inverno e una ripresa robusta in primavera. Il dosaggio consigliato è di 40-50 g/m².



PREVENZIONE E CONTROLLO DEL MUSCHIO

Freddo e umidità in prati con ridotta illuminazione, compattamento e ristagno idrico del terreno, favoriscono la comparsa del muschio. Nel caso di macchie estese applicare in modo localizzato **LandscaperPro Shade Special** 11-5-5 + 8Fe, che ostacola la crescita del muschio. Dose consigliata: 35 g/m².

A distanza di alcuni giorni è necessario asportare le parti secche e se le condizioni climatiche lo consentono, effettuare la risemina con **Landscaper Pro Rapid** o **Landscaper Pro Superfast** seguita da una leggera terriccatura.

