DEDICATE®

Fungicida sistemico e mesostemico
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

DEDICATE®

COMPOSIZIONE
100 g di Dedicate contengono:
9,09 g (100 g/l) di trifloxystrobin puro
18,18 g (200 g/l) di tebuconazolo puro
coformulanti quanto basta a 100 g





ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H362 Pu6 essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208 Contiene trifloxistrobin, 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 5-cloro-2-metil-isotiazol-3-one/2-metil-isotiazol-3-one. Pu6 provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P260 Non respirare i gas/la nebbia/ aerosol.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/il viso.
P308 + P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/ un medico.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformita alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'autorizzazione:
2022 Environmental Science FR SAS – 3 place Giovanni Da Verrazzano -69009 Lione (Francia) -
Tel: 800166071

Officine di produzione e confezionamento:
Bayer S.A.S. - Marle sur Serre (Francia)
Bayer S.A.S. - Villefranche (Francia)
Bayer AG - Dormagen (Germania)
Rallis India Limited - Gujarat (India)
Distribuito da: ICL Italia Treviso - Via Monterumici 8, 31100 Treviso (per la sola taglia da 250 ml)

Registrazione del Ministero della Salute n° 14938 del 25/11/2022
Contenuto netto: 125-250-500-750 ml; 1-2-3-5 L
Partita n.:

Prescrizioni supplementari
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Evitare che donne in eta fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte. Segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
TRIFLOXYSTROBIN 9,09%,TEBUCONAZOLO 18,18%; le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
TRIFLOXYSTROBIN
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Sintomi aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
TEBUCONAZOLO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicita sistemica solo per assorbimento di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta e necrosi epatica attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza e prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO