

WARM-UP® 100

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)
ERBICIDA SELETTIVO PER TAPPETI ERBOSI

Meccanismo d'azione: Gruppo HRAC 27 (F2)

WARM-UP® 100

Registrazione Ministero della Salute n. 18889 del 4/02/2025

Composizione

Mesotrione puro g 9,4 (=100 g/L)
coformulanti q.b.a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H361d – Sospettato di nuocere al feto.

H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 – Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one (CAS: 2634-33-5). Può provocare una reazione allergica.

EUH401 – Per evitare i rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P308+P313 – In caso di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico. P314 – In caso di malessere, consultare un medico. P332 + P313 – In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 - Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative vigenti sui rifiuti pericolosi.

Nufarm Italia S.r.l. – via guelfa 5 – 40138 - Bologna. Tel. 051 0394022

Distribuito da: I.C.L. Italia Treviso S.r.l. - Via Monterumici 8 - 31000 Treviso – tel. 0422.436631

Stabilimento di produzione:

Nufarm S.A.S. - Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon, Francia

Stabilimento di confezionamento:

Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Chemia S.p.A. - Terre del Reno (FE)

Contenuto 250 – 500 ml; 1 – 5 – 10 – 15 – 20 L

Partita n....

® Marchio registrato Nufarm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Durante le fasi di miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto indossare guanti e abbigliamento protettivo (tuta e scarpe adatte). Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

Per proteggere le piante non bersaglio, non trattare in una fascia di rispetto da vegetazione naturale di:

Coltura	Dosaggio (L/ha)	Fascia di rispetto	Riduzione della deriva
Tappeti erbosi	1,5	15	-
		10	50%
		5	75%

CARATTERISTICHE

WARM-UP® 100 è un erbicida selettivo, di pre-emergenza e post-emergenza di tappeti erbosi, per il controllo di numerose infestanti dicotiledoni e alcune importanti graminacee. Il prodotto appartiene alla famiglia chimica dei trichetoni e agisce per via fogliare

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30/07/2025 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 1/10/2025

inibendo l'enzima HPPD. I sintomi sulle malerbe si manifestano come imbianchimenti, seguiti dal completo disseccamento delle infestanti.

INFESTANTI SENSIBILI

Amaranto (*Amaranthus* spp.), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Centocchio (*Stellaria* spp.), Erba morella (*Solanum nigrum*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Farinello ibrido (*Chenopodium hybridum*), Lappola (*Xanthium* spp.), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Senecione comune (*Senecio vulgaris*), Stramonio (*Datura stramonium*), Viola (*Viola arvensis*).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI

Corregiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo (*Polygonum convolvulus*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Giavone (*Echinochloa crus-galli*) e Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*).

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il trattamento deve essere eseguito con colture in buono stato vegetativo: non applicare il prodotto su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per freddo, ristagni d'acqua e siccità.

In presenza di infestanti poco sensibili o oltre le 2-4 foglie si consiglia la miscela con prodotti specifici.

TAPPETI ERBOSI di festuca arundinacea (*Festuca arundinacea Schreber*), loglio comune (*Lolium perenne*), fienarola dei prati (*Poa pratensis*).

Impiegare una dose di **1,4 - 1,5 L/ha** di prodotto, preferibilmente con volumi d'acqua di almeno 400 L/ha.

Il prodotto controlla molte monocotiledoni e dicotiledoni che competono e rallentano l'insediamento dei tappeti erbosi. Il controllo delle infestanti è più efficace su piante giovani ed in attiva crescita. L'efficacia sarà ridotta in caso di stress idrico o di applicazioni su infestanti adulte.

Applicazione in pre-semina del tappeto erboso a base di festuca, loglio e poa.

Applicazione in post-emergenza del prato.

Prima di effettuare l'**applicazione su nuove semine**, attendere che il tappeto erboso appena insediato sia stato falciato almeno 3 volte, e comunque almeno quattro settimane dopo l'emergenza.

AVVERTENZE: Applicare il prodotto in condizioni di assenza di vento. Evitare che la deriva giunga sulle colture adiacenti.

Al termine dell'applicazione è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura con una soluzione di acqua ed idoneo detergente.

GESTIONE DELLA RESISTENZA

Il prodotto contiene mesotrione, principio attivo inibitore dell'enzima 4-HPPD. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina; alternare o associare a WARM-UP 100 prodotti aventi un differente meccanismo d'azione. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare le autorità competenti (Servizio Fitosanitario regionale di riferimento) in caso di sospetta resistenza.

FITOTOSSICITÀ

Alcuni giorni dopo il trattamento si possono manifestare sulle colture sintomi transitori rappresentati da decolorazioni o imbianchimenti fogliari che non hanno conseguenze sullo sviluppo e la produzione delle colture.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**