



Fungicida Anti-Pythium*

 Fungicida efficace, flessibile e adattabile per il contenimento di Pythium spp. su tappeti erbosi

Descrizione

Fungicida Anti-Pythium* è un fungicida flessibile e adattabile e la sua efficacia si basa su Cyazofamid 9,5 % (100 g/l) agisce in modo altamente selettivo sugli Oomiceti di cui Pythium fa parte. Il suo meccanismo d'azione inibisce la respirazione mitocondriale del patogeno, interferendo con gli stadi critici del ciclo infettivo, come zoospore e sporangi, consentendo un'efficace protezione sia preventiva sia nelle prime fasi dell'infezione. Le caratteristiche del principio attivo di questo fungicida Anti-Pythium* (appartenente alla classe FRAC 21) sono esaltate dallo specifico surfattante organo-siliconico.

*Daramun

Patologie controllate

Pythium spp.

Vantaggi

-  Controlla Pythium spp
-  Azione preventiva e curativa precoce
-  Elevata resistenza al dilavamento

 Ideale per tutti i tappeti erbosi: nuove semine e prati maturi

 Miscibile con Heritage per il controllo simultaneo Phythium- Rizotonia

Caratteristiche

Composizione	Cyazofamid 9,5 % (100 g/l)
Registrazione n°	16946 del 16/01/2020
Formulazione	sospensione concentrata
Marchio registrato	Diachem
Imballo	20×500 ml
Aree di utilizzo	tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi (campi da golf, campi sportivi, campi da bocce).

Dosaggi

ATTECCHIMENTO PRATO Tappeti erbosi (Prati e Prati ornamentali, Campi da golf, Campi sportivi) utilizzare **2,5 l/ha**. Intervallo tra i trattamenti di 10 gg, totale n. 3 interventi alla dose di 2,5 l/ha

PRATO SVILUPPATO Tappeti erbosi (Prati e Prati ornamentali, Campi da golf, Campi sportivi) utilizzare **3 l/ha**. Intervallo tra i trattamenti di 10 gg, totale n. 2 interventi alla dose di 3 l/ha

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Modalità d'uso

Intervenire in **via preventiva** al verificarsi delle condizioni predisponenti alla malattia **o alla comparsa dei primi sintomi**. In particolare, intervenire in fase di attecchimento del tappeto erboso e quando il tappeto erboso copre uniformemente il terreno in presenza di elevata temperatura e umidità ambientale, avendo cura di **non superare la dose complessiva di 7.5 litri di prodotto** (equivalenti a 750 g di sostanza attiva) nell'arco dell'intera stagione. In caso di trattamenti consecutivi, **rispettare un intervallo di dieci giorni** fra gli stessi.

Attenzione

Eeguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/turf-landscape/products/anti-pythium/>

Ultimo aggiornamento: 07/10/2026

ICL Growing Solutions Italia

©2026 ICL. Tutti i diritti riservati

