



SOLINURE GT®

GT 11-35-11+2MgO+TE

Ideale per stimolare l'apparato radicale e potenziare la fioritura nelle prime fasi di sviluppo vegetativo

11		35		11		2.0		Micro
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		MgO		

Descrizione

La linea Solinure® GT nasce per l'impiego su tutte le colture, comprese quelle in ambiente protetto. Il posizionamento prevalente avviene in situazioni di acqua irrigua caratterizzata da valori di bicarbonati medi o medio-bassi in quanto i formulati presentano reazione debolmente acida e contengono talvolta elevate concentrazioni di solfati.

Solinure® GT 11-35-11+2MgO+TE ha un rapporto NPK 1:3:1. L'azoto è presente esclusivamente nelle forme nitrica e ammoniacale e contiene magnesio, zolfo e microelementi.

Il prodotto risulta ideale per le **prime fasi di sviluppo vegetativo**.

Può essere impiegato su orticole da post-trapianto a fioritura e su vite e arboree durante la fase primaverile al fine di **stimolare l'apparato radicale e promuovere la crescita vegetativa**.

Composizione

Forma ossidata

N	Azoto Totale	11%
	Azoto nitrico (N-NO ₃)	2.1%
	Azoto ammoniacale (N-NH ₄)	8.9%
P ₂ O ₅	Anidride fosforica	35%
	Solubile in acqua (P ₂ O ₅)	35%
K ₂ O	Ossido di Potassio	11%
	Solubile in acqua (K ₂ O)	11%
MgO	Ossido di Magnesio	2%
	Solubile in acqua (MgO)	2%
B	Boro	0.01%
	Solubile in acqua (B)	0.01%
Cu	Rame	0.002%
	Solubile in acqua (Cu)	0.002%
	Rame EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Ferro	0.04%
	Solubile in acqua (Fe)	0.04%
	Ferro EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Manganese	0.01%
	Solubile in acqua (Mn)	0.01%
	Manganese EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibdeno	0.002%
	Solubile in acqua (Mo)	0.002%
Zn	Zinco	0.002%
	Solubile in acqua (Zn)	0.002%
	Zinco EDTA (Zn)	0.002%

Vantaggi

 Ideale per stimolo dell'apparato radicale e potenziamento fioritura.

 Azoto esclusivamente nitrico e ammoniacale.

 Arricchito con magnesio, zolfo e microelementi chelati.

Dosaggi

Le informazioni riportate in questa pagina sono di carattere generale e si consiglia di testare il prodotto su scala ridotta prima dell'applicazione su vasta scala. Tali indicazioni sono eventualmente da modulare in base alla fertilità del terreno, allo sviluppo vegeto-produttivo e alla potenziale resa.

Poiché l'applicazione non avviene sotto il nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile per eventuali risultati negativi.

Modalità d'uso

-  1 Tenere lontano dall'umidità.
-  2 Sigillare i sacchi aperti o danneggiati.
-  3 Per consigli e raccomandazioni specifiche, contatta il nostro team di esperti.

Attenzione

Eeguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/agriculture/products/solinure-gt-11-35-11/>

Ultimo aggiornamento: 07/10/2026

ICL Growing Solutions Italia

©2026 ICL. Tutti i diritti riservati

