



SOLINURE GT[®]

GT 14-6-23+2MgO+TE

 La nutrizione giusta per tutte le fasi di ingrossamento frutti

14		6		23		2.0	
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		MgO	

Micro

Descrizione

La linea Solinure[®] GT nasce per l'impiego su tutte le colture, comprese quelle in ambiente protetto. Il posizionamento prevalente avviene in situazioni di acqua irrigua caratterizzata da valori di bicarbonati medi o medio-bassi in quanto i formulati presentano reazione debolmente acida e contengono talvolta elevate concentrazioni di solfati.

Solinure[®] GT 14-6-23+2MgO+TE ha un rapporto NPK particolare, che lo rende **ideale per tutte le fasi di ingrossamento frutti, dall'allegagione all'inizio maturazione.**

L'azoto presente esclusivamente in forma nitrica e ammoniacale promuove l'ingrossamento dei frutti senza arrecare alcun danno qualitativo.

Il magnesio e i microelementi chelati favoriscono la fotosintesi e il rinverdimento della pianta.

Composizione

Forma ossidata

N	Azoto Totale	14%
	Azoto nitrico (N-NO ₃)	6.1%
	Azoto ammoniacale (N-NH ₄)	7.9%
P ₂ O ₅	Anidride fosforica	6%
	Solubile in acqua (P ₂ O ₅)	6%
K ₂ O	Ossido di Potassio	23%
	Solubile in acqua (K ₂ O)	23%
MgO	Ossido di Magnesio	2%
	Solubile in acqua (MgO)	2%
B	Boro	0.01%
	Solubile in acqua (B)	0.01%
Cu	Rame	0.002%
	Solubile in acqua (Cu)	0.002%
	Rame EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Ferro	0.04%
	Solubile in acqua (Fe)	0.04%
	Ferro EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Manganese	0.01%
	Solubile in acqua (Mn)	0.01%
	Manganese EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibdeno	0.002%
	Solubile in acqua (Mo)	0.002%
Zn	Zinco	0.002%
	Solubile in acqua (Zn)	0.002%
	Zinco EDTA (Zn)	0.002%

Vantaggi

- Studiato per le fasi di ingrossamento dei frutti.
- Totale assenza di azoto ureico ed assenza di sodio e cloro.
- Arricchito con magnesio e microelementi chelati.

Dosaggi

Le informazioni riportate in questa pagina sono di carattere generale e si consiglia di testare il prodotto su scala ridotta prima dell'applicazione su vasta scala. Tali indicazioni sono eventualmente da modulare in base alla fertilità del terreno, allo sviluppo vegeto-produttivo e alla potenziale resa.

Poiché l'applicazione non avviene sotto il nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile per eventuali risultati negativi.

Modalità d'uso

- 1 Tenere lontano dall'umidità.
- 2 Sigillare i sacchi aperti o danneggiati.
- 3 Per consigli e raccomandazioni specifiche, contatta il nostro team di esperti.

Attenzione

Eeguire delle prove su scala ridotta prima di modificare il dosaggio, il tipo di applicazione o qualsiasi altra variabile. Dal momento che le circostanze di utilizzo dei nostri prodotti possono variare in modo indipendente dal nostro controllo, ICL non può essere ritenuta responsabile nel caso di risultati indesiderati. Rivolgersi al proprio esperto ICL di riferimento per consulenze specifiche.

<https://icl-growingsolutions.com/it-it/agriculture/products/solinure-gt-14-6-23/>

Ultimo aggiornamento: 07/10/2026

ICL Growing Solutions Italia

©2026 ICL. Tutti i diritti riservati

