



NUTRIVANT®

プラス ポ テ ト
Plus Potato

良質なばれいしょをより多く生産するために

0 | 43 | 28 | 2.0 | 4.6 |
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃

TE

概要

ニュートリバント・プラス・ポテトは、ばれいしょ用に特別に処方された完全水溶性の葉面散布肥料です。リンとカリウムが豊富に配合され、品質と収量を確保するために必須の多量要素を供給し、マグネシウムの吸収を高めるために窒素を含まないように設計されています。この配合により、葉全体に散布液を均一に分布させ、栄養素の浸透がより良くなるため、ばれいしょ塊茎のサイズが向上し、収量が増加すると同時に、養分利用効率も向上します。高濃度少量葉面散布において、より効果を発揮します。

欧州表示成分値

酸化物

N	窒素全量	0%
P ₂ O ₅	りん酸 (P ₂ O ₅)	43%
	水溶性 (P ₂ O ₅)	43%
K ₂ O	加里 (K ₂ O)	28%
	水溶性 (K ₂ O)	24%

MgO	マグネシウム (MgO)	2%
SO ₃	硫黄 (SO ₃)	4.6%
B	ほう素	0.5%
Mn	マンガン	0.2%
Zn	亜鉛	0.2%

利点

信頼性

塩化物を含まず、高い安全性

微量元素を豊富に含む

完全水溶性

高PK処方

クリーンな原料を使用

マグネシウム、ほう素、マンガン、亜鉛を配合

ICLは原材料と製造工程を厳格に管理し、一貫した高品質を保証

施用量

ニュートリバント・プラス・ポテト 0-43-28+2MgO+0.5B+0.2Mn+0.2Zn を 1%の濃度で 200-300L/ha、2 回散布することを推奨します。

時間帯は早朝か午後の遅い時間に散布する事をお勧めします：

施用方法	施用時期
1回目	播種後約40日（萌芽～着蕾期）
2回目	第1回散布から14日後（塊茎形成期）

施肥量、施肥方法、その他の条件を変更する前に、まず小規模で試験を行ってください。異なる環境下、当社の管理の及ばない施用において、当社ではいかなる結果に対しても、責任を負いかねますのでご了承ください。

技術情報



NutriVantを基盤とするファーマティバントテクノロジーは、葉面散布の吸収効率を高め、収量および品質の向上を実現します。最大4週間にわたる養分の供給を維持し、幅広い作物に効果をもたらします。

[詳しくはこちら](#)

注意事項

施肥量、施肥方法、その他の条件を変更する前に、まず小規模な試験を行ってください。異なる環境下、当社の管理の及ばない施用において、当社ではいかなる結果に対しても、責任を負いかねますのでご了承ください。より詳細なアドバイスについては、ICLのアドバイザーにお問い合わせください。

<https://icl-growingsolutions.com/ja-jp/agriculture/products/nutrivant-plus-potato/>

最終更新日: 13/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL 無断複写・転載を禁じます。

