

Nutrivant®

Nutrivant Plus Олійний

- Комплексне водорозчинне добриво зі спеціальним прилипачем Fertivant

Опис

Добриво для позакореневого живлення, у складі якого містяться мікроелементи, які відповідають потребам у поживних речовинах для олійних рослин.

Переваги

- Повна розчинність у воді, так як добриво виготовлено на основі водорозчинного монокалійфосфату (KH2PO4), не містить шкідливих і токсичних культурам сполук.
- Не змивається опадами протягом 15-20 днів та має підвищений коефіцієнт засвоєння сполук фосфору (понад 20%) за рахунок спеціального прилипача «Фертівант».
- Не містить хлору.
- Підвищує стійкість культур до різного роду стресів і хвороб.
- Знижує стресове навантаження.
- Гарантовано підвищує врожайність на 10-15% та якість товарної продукції.

- Склад добрива повністю відповідає фізіології мінерального живлення олійних культур: сої, соняшників, ріпаку, гороху, овочевих культури групи капуст, цибулинних культур – часнику, цибулі. За рахунок легкодоступної мінеральної поживи до- брива поліпшуються обмінні процеси культур, підвищується на 10-15% їх урожайність, товарність, якість товарної продукції: накопичення сухої речовини, вмісту олії на 2-3%, цукрів та поліпшується зберігання.

- Добриво користується високою популярністю серед аграріїв України.

Дози внесення

Використання добрива для позакореневого підживлення

Соняшник – у фазах 3-4 листків, 2кг/га та 6-7 пар справжніх листків, 3 кг/га.

Ріпак озимий – у фазах: осінньої розетки (5-6 листків), 2 кг/га, відростання весняної розетки-початок стеблування (7-10 листків), 3 кг/га та зеленого бутона, 2-3 кг/га. За комбінованого застосування з 10% розчином карбаміду проявляється синергія щодо підвищення продуктивності культур.

Ріпак яровий – на початку утворення бутона, 3 кг/га комбіновано з 7% розчином карбаміду.

Соя – у фазах: 5-6 листків,2 кг/га, на початку бутонізації 2 кг/га та у період наливу перших нижніх бобиків, 2 кг/га. Рекомендується останнє підживлення комбінувати з 2-3% розчином карбаміду, що дозволить підвищити масу 1000 насінин верхніх бобиків та врожайність на 15-20%.

Капуста – у фазах: 4-6 листків, 2 кг/га, формуванні головки, 3 кг/га, нещільної головки, 2-3 кг/га.

Цибуля, часник – у фазах: 4-6 листків, 2 кг/га, інтенсивного наростання вегетативної маси, 2 кг/га та за формування цибулини, 2 кг/га.

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Склад

Хімічний склад:
Фосфор водорозчинний 20 %
Калій водорозчинний 33 %
Магній водорозчинний 1 %
Сірка водорозчинна 7,5 %
Бор водорозчинний 1,5 %
Марганець хелат ЕДТА 0,5 %
Цинк хелат ЕДТА 0,02 %
Молібден водорозчинний 0,001 %
Фертівант +

Фізичні властивості:
Розчинність у воді 1% рідина утворює стійкий гомогенний розчин

Щільність злежування 1,25 г/см3.

Кислотність, pH 1% водного розчину 4,1 – 4,2

Електропровідність, EC 63 – 0,68 мСі/см

Максимальна розчинність у воді за t=20oC 27,5 – 36,5 г/100 мл

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/nutrivant-plus-oil/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions
©2024 ICL. Всі права захищені