

Agroleaf® Liquid

Moly B

Ваше рідке добриво преміум-класу з бором і молібденом.

4	16	4	TE
N	P_2O_5	K_2O	

Опис

Agroleaf® Liquid Moly B - це високоякісне азотно-фосфорно-калієве рідке добриво позакореневого внесення, яке збагачене бором і має високу концентрацію молібдену. Добриво розроблене для культур із високою потребою бору й молібдену і швидко усуває дефіцит цих елементів. Секрет добрива Agroleaf® Liquid Moly B - це технологія F3 SurfActive, спеціально розроблена ICL, щоб збільшити ефективність позакореневого внесення добрив. Ваші рослини почуваються краще через поліпшене нанесення, адгезію та утримання поживних речовин. Ця технологія зменшує поверхневий натяг крапель, тож поживні речовини краще поширюються листям рослини; це збільшує площу покриття добривом та покращує поглинання рослиною мікроелементів. Більше поживних речовин затримуються в рослині замість того, щоб стікати униз чи відштовхуватись від вкритого восковою плівкою листя. Технологія F3 також уможливлює формування на листі рослини маленьких скупчень поживних речовин, які знову активуються після потрапляння на рослину вологи. Це запобігає випаровуванню, таким чином подовжуючи тривалість підживлення й оптимізуючи листкове внесення добрива.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**4%**
	Амонійний азот (N-$NH_{4</sub}$)	2.6%

	Сечовинний азот (N-сечовина)	1.4%
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**16%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	16%
K_2O	Оксид калію	**4%**
	Водорозчинний (K_2O)	4%
B	Бор	**0.1%**
	Водорозчинний (B)	0.1%
Mo	Молібден	**2%**
	Водорозчинний (Mo)	2%

Переваги

- Придушує дефіцит бору й молібдену в зародку, або ж усуває його наслідки
- Підходить для широкого спектру культур
- Краще нанесення, адгезивність і утримання добрива

Дози внесення

Рекомендації для окремих культур	Дозування в літрах/га	Об'єм води в літрах/га	Концентрація (%)	Час внесення
Плодоносні овочі, Картопля	0.5-1	300-600 250-300	0.2 0.2-0.3	Впродовж усього періоду вегетації, Для культур, що ростуть на полі, після змикання рядіів
Бобові (соєві боби)	1-2	300	0.3-0.7	При появі 6 листків
Капуста, Цвітна капуста, Броколі	1-3	300-600	0.3-0.5	При появі 6-8 листків, 2-3 рази

Ріпак	0.5-1 1-2	200-300	0.25-0.5 0.3-0.7	Восени, Навесні до цвітіння, 2 рази
Соняшник	1-3	200-300	0.5-1	При появі 4-6 листків
Цукровий буряк	1-3	250-400	0.4-0.8	При появі 6-8 листків
Паша	0.5-1	200-300	0.25-0.3	Впродовж усього періоду вегетації, 2-3 рази

Використовуйте менші дози у менших об'ємах води/га і більші дози, коли об'єм води збільшується. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agroleaf-liquid-moly-b/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions
©2024 ICL. Всі права захищені