

Foliar Feed

Agroleaf® Liquid

B-10

Більше бору для найкращої якості врожаю

0	0	0	TE
N	P_2O_5	K_2O	

Опис

Agroleaf® Liquid B-10 — це рідке добриво, насичене бором у формі етаноламіну бору. Використовується для запобігання або корекції змін, спричинених нестачею або дисбалансом у засвоєнні цього мікроелемента. Добриво можна вносити як листковим, так і кореневим способом для деревних та трав'янистих культур. Дефіцит бору - найбільш широко розповсюджена проблема нестачі мікроелемента у світі; це спричиняє серйозні втрати врожаю та падіння його якості. При нестачі бору в рослин гальмується вегетативний ріст та генеративний розвиток, погіршується ділення клітин, відмирає меристема та зменшується родючість. Але всього цього можна уникнути. Просто застосовуйте Agroleaf® Liquid B-10 та влаштуйте своїм рослинам борову ванну.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**0%**
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**0%**

K_2O	Оксид калію	**0%**
B	Бор	**10%**
	Водорозчинний (B)	10%

Переваги

- Усуває дефіцит бору
- Підходить для деревних та трав'янистих культур
- Листкове або кореневе внесення

Дози внесення

Культури:	Методи внесення:
Оливки:	Удобрювати слід за 30 днів до цвітіння та у фазі затвердіння кісточки дозою 150-300 куб. см./гкл із загальним об'ємом внесення 800-1000 л/га.
Цитрусові й плодові дерева:	Вносити добриво перед цвітінням, облітанням пелюсток та утворенням плодів дозою 150-300 куб. см./гкл.
Овочі	Внести 150-300 куб. см./гкл за 15 днів до початку цвітіння.

Випробуйте добриво на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Для культур, які особливо чутливі до дефіциту бору, рекомендується превентивне кореневе або листкове підживлення, при якому вказана доза ділиться на 2 чи 3 порції.
2. У деревних культурах після цвітіння й зав'язування плодів рекомендуємо проводити превентивні внесення добрива у періоди збільшення кількості спалахів захворювань, а в орних культурах під час початкових фаз вегетативного росту.

3. У випадку дефіциту бору виконайте два чи три послідовних внесення B-10 із інтервалом у 15-20 днів; за потреби також продовжуйте вносити добриво кореневим способом.
4. Зберігайте в сухому місці.
5. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки добрива.
6. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agroleaf-liquid-b-10/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions
©2024 ICL. Всі права захищені