

Foliar Feed

Agroleaf® Liquid

Man Z+

Усунення дефіциту мангану й цинку одним продуктом

0	0	0	TE
N	P_2O_5	K_2O	

Опис

Проблема нестачі двох поживних елементів має одне вирішення: Agroleaf® Liquid Man Z+. Містить мікроелементи манган і цинк у хелатній формі, підготовлені для нанесення у формі спрею чи фертигації, підходить як для орних культур, так і для плодових дерев. Man Z+ може використовуватися для запобігання чи усунення наслідків нестачі мангану й цинку, і містить більше мангану, ніж його продукт-близнюк Agroleaf® Liquid Zinc M+. Використовуйте як листковий спрей для орних культур в якості запобіжного засобу. Найкраще застосовувати Man Z+ під час періоду найбільшого вегетативного росту. На плодових деревах рекомендується вносити під час ініціації та розвитку бруньок, уникаючи періоду повного цвітіння. При нанесенні фертигацією, Man Z+ рекомендується використовувати як запобіжний засіб.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**0%**
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**0%**

K_2O	Оксид калію	**0%**
Mn	Марганець	**4.7%**
	Водорозчинний (Mn)	4.7%
	Хелат марганцю (EDTA) (Mn)	4.7%
Zn	Цинк	**1.3%**
	Водорозчинний (Zn)	1.3%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	1.3%

Переваги

- Два в одному: усуває наслідки й запобігає дефіциту мангану й цинку
- Більше мангану, ніж у Agroleaf® Liquid Zinc M+
- Підходить як для орних культур, так і для плодових дерев

Дози внесення

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Загальні вказівки: проведіть 2-3 запобіжних нанесення на орні культури під час періоду найбільшого вегетативного росту, і на деревних культурах під час ініціації й розвитку бруньок, уникаючи періоду повного цвітіння.
2. Розбавляйте у співвідношенні 200-350 куб. см./гкл, не перевищуючи межі в 8 л./га на одне нанесення. При видимих симптомах дефіциту наносьте максимальну дозу.
3. Використовуйте змочувач.
4. Листковий спрей для цитрусових: для цитрусових нанесіть першу дозу навесні, при появі нових гілок, коли достатньо розвинуте молоде листя досягає 2/3 свого повного розміру. Застосуйте вдруге впродовж 15 днів, і потім знову під час літнього цвітіння.
5. При нанесенні менш ніж 2000 л./га, застосовуйте вищі дози (350 куб. см./гкл); при вищих дозах (до максимуму в 3000 л./га), застосовуйте половину дози (250 куб. см./га).

6. Листковий спрей для плодів з кісточкою і насінних плодів: застосовуйте під час періодів найбільшого вегетативного росту, коли культура має достатню масу листя. Рекомендована доза становить 150-250 куб. см./гкл, максимальне використання 1000 л./га.
7. Овочі: рекомендована доза складає 150-200 куб. см./гкл. з максимальним використанням від 800 до 1000 л./га.
8. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agroleaf-liquid-man-z/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions
©2024 ICL. Всі права захищені