

Foliar Feed

Agroleaf® Liquid

Zinc M+

Одне вирішення проблеми нестачі як цинку, так і мангану.

0	0	0	TE
N	P_2O_5	K_2O	

Опис

Із Agroleaf® Liquid Zinc M+ проблема нестачі двох поживних елементів вирішується одним продуктом. Містить мікроелементи цинк і манган у хелатній формі. Можна використовувати у вигляді листкового спрею чи фертигації як для орних культур, так і для деревних рослин. Zinc M+ може використовуватися для запобігання чи усунення наслідків нестачі цинку і мангану, і містить більше цинку, ніж його продукт-близнюк Agroleaf® Liquid Man Z+. Використовуйте як листковий спрей для орних культур в якості запобіжного засобу. Найкраще застосовувати Zinc M+ під час періоду найбільшого вегетативного росту. На плодових деревах рекомендується вносити під час ініціації та розвитку бруньок, уникаючи періоду повного цвітіння. При нанесенні фертигацією, Zinc M+ рекомендується використовувати як запобіжний засіб.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**0%**
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**0%**

K_2O	Оксид калію	**0%**
Mn	Марганець	**2.3%**
	Водорозчинний (Mn)	2.3%
	Хелат марганцю (EDTA) (Mn)	2.3%
Zn	Цинк	**3.7%**
	Водорозчинний (Zn)	3.7%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	3.7%

Переваги

- Два в одному: усуває наслідки й запобігає дефіциту мангану й цинку
- Більше цинку, ніж в Agroleaf® Liquid Man Z+
- Підходить як для орних культур, так і для плодових дерев

Дози внесення

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Загальні вказівки: проведіть 2-3 запобіжних нанесення на орні культури під час періоду найбільшого вегетативного росту, і на деревних культурах під час ініціації й розвитку бруньок, уникаючи періоду повного цвітіння. Розбавляйте у співвідношенні 200-400 куб. см./гкл, не перевищуючи межі в 8 л./га на одне нанесення. При видимих симптомах дефіциту наносьте максимальну дозу.
2. Листковий спрей для цитрусових: для цитрусових нанесіть першу дозу навесні, при появі нових гілок, коли достатньо розвинуте молоде листя досягає 2/3 свого повного розміру. Застосуйте вдруге впродовж 15 днів, і потім знову під час літнього цвітіння. При нанесенні менш ніж 2000 л./га, застосовуйте вищі дози (350 куб. см./гкл); при вищих дозах (до максимуму в 3000 л./га), застосовуйте половину дози (250 куб. см./га).
3. Плоди з кісточкою і насінні плоди: застосовуйте під час періодів найбільшого вегетативного росту, коли культура має достатню масу листя. Рекомендована доза становить 200-250 куб. см./гкл, максимальне використання 1000 л./га.

4 Овочі: рекомендована доза складає 150-200 куб. см./гкл. з максимальним використанням від 800 до 1000 л./га.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agroleaf-liquid-zinc-m/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions
©2024 ICL. Всі права захищені