

Agroleaf® Special

Zn

Впорайтеся з нестачею цинку за допомогою цього водорозчинного добрива.

0	0	0	TE
N	P_2O_5	K_2O	

Опис

Agroleaf® Special Zn - це високоякісне добриво позакореневого внесення, яке запобігає та контролює дефіцит цинку. Воно може застосовуватися для широкого спектра культур , - наприклад, зернові, овочі, квіти й фруктові дерева. Також це добриво повністю водорозчинне і саме тому це популярний вибір у сільському господарстві та садівництві. Продукт містить X_3 Active, спеціальну амінокислоту, яка допомагає рослинам швидко всотувати Special Zn. Це зменшує фізіологічний стрес, викликаний нестачею мангану, всього за два дні. Підготовка розчину - це простий процес, і добриво дуже швидко повністю розчиняється. Для виготовлення Agroleaf® Special Zn ми використовуємо лише найновіші технології, і добриво має найвищу концентрацію активних речовин з-поміж продуктів такого типу. Special Zn також можна змішувати в одній тарі з широким асортиментом інших добрив та сумішей для захисту рослин, таким чином зменшуючи ваш час роботи в полі.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**0%**
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**0%**
K_2O	Оксид калію	**0%**

Zn	Цинк	**14%**
	Водорозчинний (Zn)	14%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	14%

Переваги

- Усуває дефіцит цинку
- Швидко та ефективно всотується для боротьби зі стресом
- Покращує метаболізм рослин

Дози внесення

Оптимальний час нанесення - пізнє пообіддя чи вечір.

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Оптимальний час нанесення - пізнє пообіддя чи вечір. Уникайте нанесення за несприятливих умов, як-от на рослинах, що відчувають нестачу води, низька відносна вологість повітря, високі температури, або якщо впродовж трьох днів очікуються опади. Якщо опади відбуваються впродовж 4 годин після нанесення, нанесіть засіб повторно через 3-4 дні.
2. Протестуйте продукт у кінцевій концентрації на маленькому масштабі на кількох рослинах, за тиждень до основного комерційного нанесення. Перевірте результати через декілька днів.
3. Зробіть так само, особливо якщо маєте намір змішати продукт з іншими речовинами.
4. Використовуйте обприскувач під високим тиском, з носиком, який утворює дуже дрібні краплі.
5. Заповність тару для нанесення до половини; увімкніть мішалку. Покладіть всю кількість Agroleaf® Special Zn, яку збираєтесь використати, до тари, і почекайте, поки вона повністю розчиниться. Покладіть всю кількість фунгі- та/або інсектицидів, яку збираєтесь використати, до тари. Впевніться, що рівень pH знаходиться між 4 та 6.5; за необхідності виправте його за допомогою дуже маленької кількості Nova® PeKacid.

6. Наповніть резервуар розприскувача доверху. Негайно починайте розприскування та не зупиняйтеся, поки резервуар не спорожніє. Не залишайте розчин для розприскування на ніч.

7. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agroleaf-special-zn/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions

©2024 ICL. Всі права захищені