

Agroleaf® Special

Mn

Водорозчинне добриво для запобігання та контролю дефіциту марганцю.

0	0	0
N	P_2O_5	K_2O

Опис

Agroleaf® Special Mn - це високоякісне добриво позакореневого внесення, яке запобігає та контролює дефіцит мангану. Воно повністю водорозчинне і може застосовуватися для широкого спектра культур , - наприклад, зернові, овочі, квіти й фруктові дерева. Саме тому його широко використовують у сільському господарстві та садівництві. Продукт містить X_3 Active, спеціальну амінокислоту, яка допомагає рослинам швидко всотувати Special Mn. Це зменшує фізіологічний стрес, викликаний нестачею мангану, всього за два дні. Крім того, добриво швидко повністю розчиняється у воді, а отже, підготовка розчину не є складною і не викликає проблем. Agroleaf® Special Mn виготовлене з найчистішої сировини за допомогою найновіших технологій, і має найвищу концентрацію активних речовин з-поміж продуктів такого типу. Special Mn також можна змішувати в одній тарі з широким асортиментом інших добрив та сумішей для захисту рослин, таким чином зменшивши кількість роботи в полі.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**0%**
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**0%**
K_2O	Оксид калію	**0%**

Mn	Марганець	**12%**
	Водорозчинний (Mn)	12%
	Хелат марганцю (EDTA) (Mn)	12%

Переваги

- Зменшує дефіцит мангану
- Швидке всотування та ефективне засвоєння для усунення стресу
- Покращує метаболізм у рослин

Дози внесення

Середня рекомендована доза внесення - від 0.2 до 0.3% для всіх культур

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Оптимальний час нанесення - пізнє пообіддя чи вечір.
2. Уникайте нанесення за несприятливих умов, як-от на рослинах, що відчувають нестачу води, низька відносна вологість повітря, високі температури, або якщо впродовж трьох днів очікуються опади. Якщо опади відбуваються впродовж 4 годин після нанесення, нанесіть засіб повторно через 3-4 дні.
3. Використовуйте обприскувач під високим тиском, з носиком, який утворює дуже дрібні краплі
4. Протестуйте продукт у кінцевій концентрації на маленькому масштабі на кількох рослинах, за тиждень до основного комерційного нанесення. Перевірте результати через декілька днів. Зробіть так само, особливо якщо маєте намір змішати продукт з іншими речовинами.
5. Заповність тару для нанесення до половини; увімкніть мішалку.
6. Покладіть всю кількість Agroleaf® Special Mn, яку збираєтесь використати, до тари, і почекайте, поки вона повністю розчиниться.

7. Покладіть всю кількість фунгі- та/або інсектицидів, яку збираєтесь використати, до тари. Впевніться, що рівень pH знаходиться між 4 та 6.5; за необхідності виправте його за допомогою дуже маленької кількості Nova® PeKacid.

8. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agroleaf-special-mn/

Останнє оновлення : 16/12/2024

ICL Growing Solutions

©2024 ICL. Всі права захищені