

E MAX Release Technology | N COATED | 2-3

Agromaster®

12-5-20+2CaO+4MgO+35SO3

Отримайте багатий врожай у відкритому ґрунті

12	5	20	2
N	P_2O_5	K_2O	CaO

4.0	35
MgO	SO_3

Опис

Подаруйте своїм овочам і фруктам у відкритому ґрунті та в теплиці потужний заряд поживних речовин із Agromaster® 12-5-20+2CaO+4MgO+35SO3 2-3M. Насичена калієм азотно-фосфорно-калійна формула з додатковим кальцієм, магнієм і сульфуром доповнюється 41% вкритим оболонкою азотом за допомогою технології ICL E-Max Release. Це дозволяє вам захистити ваші рослини з середньою тривалістю циклу вегетації від втрати азоту навіть за найнесприятливішої погоди та умов вирощування.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**12%**
	Нітратний азот (N-NO_3)	1.4%
	Амонійний азот (N-$NH_{4</sub}$)	5.7%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	4.9%
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**5%**

	Водорозчинний (P_2O_5)	3.8%
K_2O	Оксид калію	**20%**
	Водорозчинний (K_2O)	20%
CaO	Оксид кальцію	**2%**
	Водорозчинний (CaO)	2%
MgO	Оксид магнію	**4%**
SO_3	Триоксид сірки	**35%**

Переваги

- Азотно-фосфорно-калійна формула з високим вмістом калію для збільшення врожаю
- Додатковий кальцій для кращого транспортування та зберігання плодів
- Більше магнію для пожвавлення фотосинтезу

Дози внесення

Сільськогосподарські культури	Внесення
Овочі (в теплиці чи у відкритому ґрунті)	
Помідор, перець, баклажан	400-800 kg/ha
Огірок, корнішон, цукіні, диня, кавун	400-800 kg/ha
Цибуля, часник	400-800 kg/ha
Морква й інші коренеплоди	400-800 kg/ha
Салат Айсберг	400-800 kg/ha
Ягоди, що вирощуються в ґрунті	

Полуниця	400-800 kg/ha

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, спосіб внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Вносити врозкид, в ряд чи стрічковим способом.
2. Закладати в ґрунт на глибині 5-10 см.
3. Де можливо, вносити продукт під системами крапельного зрошення.
4. Покращте ефективність продукту зрошенням після внесення.
5. Зменшіть дозування, якщо в другій частині циклу вегетації використовуються водорозчинні добрива.
6. Зберігайте в сухих умовах.
7. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки добрива.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agromaster-12-5-202cao4mgo35so3/

Останнє оновлення : 07/02/2025

ICL Growing Solutions
©2025 ICL. Всі права захищені