

2

Solinure® GT

2

Нехай ваші плодові культури процвітають незалежно від циклу вегетації й пори року

7	19	38	2.0	TE
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Опис

Добриво для фертигації Solinure® GT 2 має NPK-формулу з високим вмістом калію й низьким вмістом азоту. Це ідеальне рішення для ваших фруктів у теплицях і тунельних системах не лише під час стадій росту й дозрівання плодів, а й під час холодних і темних зимових місяців. Цей надійний продукт не містить хлоридів та сечовини, і підживить ваші рослини додатковим магнієм та комплексом залишкових елементів у хелатній формі.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**7%**
	Нітратний азот ($N\text{-}NO_3$)	7%
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**19%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	19%
K_2O	Оксид калію	**38%**

	Водорозчинний (K_2O)	38%
MgO	Оксид магнію	**2%**
	Водорозчинний (MgO)	2%
B	Бор	**0.01%**
	Водорозчинний (B)	0.01%
Cu	Мідь	**0.002%**
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	**0.04%**
	Водорозчинний (Fe)	0.04%
	Хелат заліза (EDTA) (Fe)	0.04%
Mn	Марганець	**0.01%**
	Водорозчинний (Mn)	0.01%
	Хелат марганцю (EDTA) (Mn)	0.01%
Mo	Молібден	**0.002%**
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	**0.002%**
	Водорозчинний (Zn)	0.002%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.002%

Переваги

- Ідеальне для етапів росту й дозрівання плодів
- Створене для застосування у теплицях і тунельних системах
- Містить додатковий магній та залишкові елементи

Дози внесення

Культури:	Внесення
Культури й овочі у відкритому ґрунті та в теплицях:	40-60 кг/га на тиждень
Ягоди, дерева та кісточкові плоди:	30-50 кг/га на тиждень

*Загальна рекомендована доза внесення: Вносьте 4-5 кг/1000 м.кв. на тиждень. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Використовуйте Solinure® GT 2 для стадій росту й дозрівання плодів, а також під час зимового плодоношення.
2. Зберігайте в сухих умовах.
3. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки продукту.
4. Для детальних порад і рекомендацій, сконтактуйте з ICL чи вашим професійним порадником.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/solinure-gt-2/

Останнє оновлення : 13/09/2026

ICL Growing Solutions
©2026 ICL. Всі права захищені