

Solinure® GT

31

Покажіть своїм рослинам, що маєте GT

17	8	27	3.0	TE
N	P_2O_5	K_2O	CaO	

Опис

Для потужної й багатої на кальцій порції поживних речовин для ваших рослин у тунельних системах і теплицях, застосуйте добриво для фертигації Solinure® GT 31. Його NPK-формула із високим вмістом калію й низьким рівнем фосфору допоможе запобігти можливому дефіциту кальцію у ваших рослинах завдяки доданому кальцію й повному комплексу залишкових речовин. Цей тонкий баланс також підтримає ваші рослини під вас репродуктивної стадії циклу вегетації. Вільний від небажаних хлоридів та сечовини, цей недорогий продукт подарує вашим рослинам лише те, чого вони справді потребують.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**17%**
	Нітратний азот (N-NO_3)	8.9%
	Амонійний азот (N-$NH_{4</sub}$)	8.1%
P_2O_5	Пентоксид фосфору	**8%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	8%

K_2O	Оксид калію	**27%**
	Водорозчинний (K_2O)	27%
CaO	Оксид кальцію	**3%**
	Водорозчинний (CaO)	3%
B	Бор	**0.01%**
	Водорозчинний (B)	0.01%
Cu	Мідь	**0.002%**
	Водорозчинний (Cu)	0.002%
	Хелат міді (EDTA) (Cu)	0.002%
Fe	Залізо	**0.04%**
	Водорозчинний (Fe)	0.04%
	Хелат заліза (EDTA) (Fe)	0.04%
Mn	Марганець	**0.01%**
	Водорозчинний (Mn)	0.01%
	Хелат марганцю (EDTA) (Mn)	0.01%
Mo	Молібден	**0.002%**
	Водорозчинний (Mo)	0.002%
Zn	Цинк	**0.002%**
	Водорозчинний (Zn)	0.002%
	Хелат цинку (EDTA) (Zn)	0.002%

Переваги

- Надзвичайно надійний продукт
- Розумний склад дарує необхідні поживні речовини
- Додатковий кальцій та залишкові елементи для повного живлення

Дози внесення

Культури:	Внесення
Культури й овочі у відкритому ґрунті та в теплицях:	40-60 кг/га на тиждень
Ягоди, дерева та кісточкові плоди:	30-50 кг/га на тиждень

*Загальна рекомендована доза внесення: Вносьте 4-10 кг/1000 м.кв. на тиждень. Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, метод внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Застосовуйте Solinure® GT 31 у репродуктивній стадії циклу вегетації, особливо за нестачі кальцію.
2. Зберігайте в сухих умовах.
3. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки продукту.
4. Для детальних порад і рекомендацій, сконтактуйте з ICL чи вашим професійним порадником.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/solinure-gt-31/

Останнє оновлення : 13/09/2026

ICL Growing Solutions
©2026 ICL. Всі права захищені