

E MAX Release Technology | N COATED | 2-3

Agromaster®

12-12-22+3.7CaO+2MgO+13.5SO3

Багато дощів - багато врожаю

12	12	22	3.7
N	P_2O_5	K_2O	CaO

2	13.5
MgO	SO_3

Опис

Допоможіть своїм овочам, картоплі та вирощуваним у ґрунті фруктам впоратися із найсуворішими умовами за допомогою Agromaster® 12-12-22+3.7CaO+2MgO+13.5SO3 2-3M. Класична пропорція азоту, фосфору й калію 2-2-4, а також додатковий кальцій, магній та сульфур - це ваше ідеальне рішення, щоб задовольнити високу потребу в калії ваших рослин як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. Забезпечте своїм рослинам контрольоване, надійне і постійне живлення азотом впродовж 2-3 місяців навіть у найсуворіших середовищах і умовах завдяки новітній технології ICL E-Max Release Technology.

Гарантований аналіз

Оксид

N	Загальний азот	**12%**
	Амонійний азот (N-$NH_{4</sub}$)	4.5%
	Сечовинний азот (N-сечовина)	7.5%

P_2O_5	Пентоксид фосфору	**12%**
	Водорозчинний (P_2O_5)	10%
K_2O	Оксид калію	**22%**
	Водорозчинний (K_2O)	22%
CaO	Оксид кальцію	**3.7%**
	Водорозчинний (CaO)	3.7%
MgO	Оксид магнію	**2%**
	Водорозчинний (MgO)	2%
SO_3	Триоксид сірки	**13.5%**
	Водорозчинний (SO_3)	13.5%

Переваги

- Ідеальне співвідношення азоту, фосфору й калію для більшого врожаю
- Додатковий кальцій для кращого транспортування та зберігання плодів
- Містить додатковий магній для пожвавлення фотосинтезу

Дози внесення

Сільськогосподарські культури	Внесення
Картопля (для подальшої обробки й споживання)	400-800 kg/ha
Овочі (в теплиці чи у відкритому ґрунті)	
Помідор, перець, баклажан	400-800 kg/ha
Огірок, корнішон, цукіні, диня, кавун	400-800 kg/ha

Цибуля, часник	400-800 kg/ha
Морква й інші коренеплоди	400-800 kg/ha
Салат Айсберг	400-800 kg/ha
Ягоди, що вирощуються в ґрунті	
Полуниця	400-800 kg/ha

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу, спосіб внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

Як користуватися

1. Вносити врозкид, в ряд чи стрічковим способом.
2. Закладати в ґрунт на глибині 5-10 см.
3. Де можливо, вносити продукт під системами крапельного зрошення.
4. Покращте ефективність продукту зрошенням після внесення.
5. Зменшіть дозування, якщо в другій частині циклу вегетації використовуються водорозчинні добрива.
6. Зберігайте в сухих умовах.
7. Щільно закривайте частково використані чи пошкоджені упаковки добрива.
8. Якщо ви потребуєте більше інформації, будь ласка, зверніться до вашого спеціаліста з технічної підтримки.

Attention

Випробуйте продукт на невеликому масштабі перед тим, як змінювати дозу внесення чи будь-який інший фактор. Позаяк ваші умови можуть відрізнятися, і використання наших продуктів від нас не залежить, ICL не несе відповідальності за будь-які небажані результати.

https://icl-growingsolutions.com/uk-ua/agriculture/products/agromaster-12-12-223-7cao2mgo13-5so3/

Останнє оновлення : 13/09/2026

ICL Growing Solutions

©2026 ICL. Всі права захищені