Specyfikacja produktu



Osmocote® Pro

Pro High K

- Dla dobrego rozkrzewiania i zwartego wzrostu

Opis

Osmocote® Pro High K 5-6M doskonale sprawdza się w przypadku roślin doniczkowych wymagających nawożenia o wysokiej zawartości potasu, a także w sytuacjach, gdy woda używana do nawadniania zawiera dużo azotu. Dzięki formule bogatej w NPK, magnez oraz mikroelementy nawóz wspomaga dobre rozkrzewianie się roślin i ich zwarty, kompaktowy wzrost. Zapewnia spokój przez cały cykl uprawy dzięki otoczce wykonanej w 100% z żywicy, która gwarantuje równomierne uwalnianie składników pokarmowych przez określony okres działania wynoszący 5–6 miesięcy.

Korzyści

- Wysoka zawartość mikroelementów
- Możliwość łączenia z nawozami rozpuszczalnymi w wodzie
- Dodatkowa dawka potasu dla zwartego wzrostu
- Bezpieczny, prosty w stosowaniu i ekonomiczny

Dawki

	Lekkie nawożenie	Standardowe nawożenie	Intensywne nawożenie
Rośliny szkółkarskie w pojemnikach	2-2.5 g/l	3-3.5 g/l	4-4.5 g/l
Rośliny doniczkowe	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Rośliny rabatowe / jednoroczne	2-3 g/l	3-4.5 g/l	4.5-5 g/l

Uwaga Powyższe zalecane dawki dotyczą podłoży nienawożonych. Są to zalecenia ogólne. Dawki należy dostosować do konkretnych warunków uprawy, takich jak uprawa w tunelach lub szklarniach czy specyficzne warunki klimatyczne. Produkt nie jest zalecany do aplikacji punktowej (dibbling) ani do sadzenia roślin do doniczek w okresie jesienno-zimowym. W celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń skontaktuj się z doradcą ICL. Przed zmianą dawki, sposobu aplikacji lub innych parametrów należy najpierw przeprowadzić próbę na niewielką skalę. Ponieważ warunki mogą się różnić, a sposób stosowania naszych produktów pozostaje poza kontrolą ICL, firma ICL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niepożądane rezultaty.

Sposób stosowania

1. Stosuj Osmocote® Pro, aby zapewnić niezawodne i równomierne uwalnianie składników pokarmowych dzięki unikalnej technologii ICL otoczkowania żywicą.
2. Osmocote® Pro można łączyć z nawozami rozpuszczalnymi w wodzie. W takim przypadku należy odpowiednio zmniejszyć zalecane dawki podane w następnej zakładce, w zależności od ilości stosowanego nawozu rozpuszczalnego w wodzie.
3. OOkres działania Osmocote® Pro High K 5-6M zależy od temperatury (okres działania produktu określono dla temperatury 21°C): 16°C: 6–7 miesięcy, 21°C: 5–6 miesięcy, 26°C: 4–5 miesięcy
4. Upewnij się, że częściowo zużyte lub uszkodzone worki są szczelnie zamknięte.
5. Przechowuj produkt w suchych warunkach.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niekorzystne wyniki.

https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmocote-pro-high-k-5-6m/

Ostatnia aktualizacja: 15/09/2026

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com
©2026 ICL. Wszelkie prawa zastrzeżone