Specyfikacja produktu



Osmoform®

NXT

NXT – wyższy poziom ogrodnictwa

22	5	11	2.0	TE
N	P_2O_5	K_2O	MgO	

Opis

Zapewnij swoim roślinom stałą dawkę azotu i potasu z pomocą Osmoform® NXT. Dzięki nowej technologii granulacji o nazwie SILK (na bazie krzemu) Twoje rośliny będą przez dłuższy czas dostawać potas i czerpać korzyści z wysokiego poziomu tego pierwiastka, a także azotu i fosforu. Zbilansowany skład, który obejmuje azot, gwarantuje nie tylko szybkie działanie, ale też długotrwały efekt, utrzymujący się do 8–10 tygodni.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	**22%**
	Azot amoniakalny ($N\text{-}NH_4$)	2.9%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	7.6%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	11.5%

P_2O_5	Pięciotlenek fosforu	**5%**
	Rozpuszczalny w wodzie (P_2O_5)	4%
K_2O	Tlenek potasu	**11%**
	Rozpuszczalny w wodzie (K_2O)	11%
MgO	Tlenek magnezu	**2%**
Cu	Miedź	**0.02%**
Fe	Żelazo	**0.5%**
Mn	Mangan	**0.1%**
Mo	Molibden	**0.001%**
Zn	Cynk	**0.02%**

Korzyści

- Produkt przywiera do podłoża
- Szybka reakcja roślin i efekt zazielenienia
- Łatwy w użyciu

Dawki

	Nawożenie mało intensywne	Nawożenie standardowe	Nawożenie bardzo intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie	1 g/l	2 g/l	3 g/l

Uwaga Stosować maksymalnie 5–6 g na jedno miejsce. W przypadku większych donic/kontenerów podzielić produkt. Nie zostawiać niewykorzystanego produktu w dozownikach. Konieczne jest dostosowanie dawek do konkretnego składu podłoża (kory), gatunku roślin i systemu uprawy. Aby uzyskać pełne nawożenie roślin o długim cyklu produkcji, zalecamy dodatkowe zastosowanie Osmocote® Exact lub nawozu rozpuszczalnego w wodzie. Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

1. Osmoform® NXT nadaje się do stosowania powierzchniowego w uprawach kontenerowych lub w sytuacji, gdy potrzebne jest długotrwałe działanie azotu i potasu.
2. Azot i potas są uwalniane przez około 8–10 tygodni od aplikacji.
3. Przy aplikacji powierzchniowej ważne jest, aby nawóz został równomiernie rozprowadzony na powierzchni podłoża. W razie stosowania posypowego wokół roślin należy usunąć granulki z liści.
4. Częściowo zużyte lub uszkodzone worki szczelnie zamknąć.
5. Przechowywać w suchym miejscu.
6. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z obsługą techniczną.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niekorzystne wyniki.

https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/ornamental-horticulture/products/osmoform-nxt/

Ostatnia aktualizacja: 15/09/2026

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com
©2026 ICL. Wszelkie prawa zastrzeżone