



Sierraform[®] GT

Spring Start



Zapewnij swoim roślinom dobry start

16 | 0 | 16 | TE
N | P₂O₅ | K₂O

Opis

Jak sama nazwa wskazuje, Spring Start to doskonały nawóz granulowany, który pomoże Ci świetnie wejść w sezon – warto sięgnąć po niego już na samym początku wiosny. Zawiera żelazo i mangan, które pobudzają fotosyntezę i poprawiają wybarwienie roślin, oraz nieduże ilości mocznika metylenowego (MU), dzięki któremu trawa zacznie się zazieleniać, nawet jeśli jest jeszcze chłodno. W składzie znajduje się też potas w postaci o opóźnionym uwalnianiu oraz standardowo uwalniany potas i azot. W nawozie nie ma fosforanów, pomaga on więc uporać się z problemem nadmiaru fosforu. Nawóz Spring Start ma postać jednorodnych mikrogranulek stworzonych z wykorzystaniem naszych opatentowanych technologii otoczkowania MU2 i SiLK. W mgnieniu oka powstanie zdrowa, równo rosnąca murawa.

Gwarantowana analiza

Tlenek

N	Azot całkowity	16%
	Azot amoniakalny (N-NH ₄)	8.2%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	2.5%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	5.3%
P ₂ O ₅	Pięciotlenek fosforu	0%
K ₂ O	Tlenek potasu	16%
	Rozpuszczalny w wodzie (K ₂ O)	16%
Fe	Żelazo	1%
Mn	Mangan	0.3%

Korzyści

- 
 Idealny produkt do roli pierwszego nawozu w sezonie
- 
 Zapewnia zdrowie i wzrost oraz lepsze wybarwienie, a także pobudza fotosyntezę
- 
 W składzie nie ma fosforanów, dzięki czemu łatwo uporać się z problemem nadmiaru fosforu

Dawki

Zalecana dawka	20 – 30 g/m ²
----------------	--------------------------

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów.

Sposób stosowania

- 1 Stosować na suche żdźbła i podać po 1–2 dniach w razie braku deszczu. Podlanie pomaga rozprzecznić nawóz i zmniejsza ryzyko zebrania go przez kosiarkę z nisko koszonej trawy. Podlanie po zastosowaniu ogranicza ryzyko powstania odcisków stóp na trawie. Unikać stosowania w czasie mrozu lub suszy.
- 2 Opóźnić cięcie pionowe i/lub przycinanie o 3 dni po zastosowaniu, aby granulki mogły się rozprzecznić. W temperaturze gleby poniżej 10°C uwalnia się znacznie mniej azotu.
- 3 Natychmiast usunąć z płyt chodnikowych, betonu, ubrań itp., ponieważ produkt może powodować przebarwienia. Zawiera żelazo. Nie stosować w przypadku ryzyka kontaktu z betonem, marmurem, kamieniem, tkaniną lub basenami pływakowymi.
- 4 Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Zalecany okres stosowania

[illegible]

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek niekorzystne wyniki.

<https://icl-growingsolutions.com/pl-pl/turf-landscape/products/sierraform-gt-spring-start/>

Ostatnia aktualizacja: 15/09/2026

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com

©2026 ICL. Wszelkie prawa zastrzeżone

