



# BEOZ™

## BEOZ™ ACTIRISE



Свалете реколтата си



Свалете в PDF



Брошура

Свържете се с нас

## Описание

BEOZ™ ActiRISE е органична формула 3 в 1, създадена да осигури незабавен енергиен тласък на растенията по време на абиотичен стрес и при повишени хранителни нужди. Разработена на базата на задълбочен научен и практически опит, Метаболитната технология на ICL е резултат от специализирани изследвания за идентифициране, производство и фракциониране на метаболити от микробен произход. За всеки продукт от серията BEOZ™ – Nutrient Enhancers е създадена специфична метаболитна фракция, съобразена с потребностите на съответната култура. При BEOZ™ ActiRISE Метаболитната технология е насочена към активиране на метаболити, които стимулират вегетативния растеж и подпомагат растенията да се справят по-ефективно със стресовите условия. Резултатът е увеличена маса на плодовете и по-интензивен растеж. Съставът на продукта включва фосфатази, естествени хелатиращи съединения (като сидерофори), екзополизахариди, както и ензими като протеаза и целулаза. Те подпомагат по-доброто усвояване на хранителните вещества и разграждането на органичната материя. В същото време наличието на АСС деаминаза допринася за повишена устойчивост на стрес, което прави продукта особено подходящ за възискателни условия на отглеждане. С технология от трето поколение BEOZ™ ACTIRISE поставя нови стандарти в областта на биостимулантите и устойчивото земеделие.

## Ползи

- Той помага за подобряване на наличността, усвояването и движението на хранителни вещества, като калий, фосфор и желязо.
- Стимулира критичните метаболитни процеси на растенията, повишавайки ефективността при използването на енергия за растеж и производство
- Активира механизмите на индуцирана системна резистентност (ISR) за ефективно управление на абиотичния стрес.
- Той регулира реакцията на растението към стресови условия и поддържа вегетативния растеж, благодарение на наличието на естествени индуктори.

## Норми на приложение

| Култура                         | Доза<br>(мл/дка)<br>* | Брой при-<br>ложения* | Време на приложение                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цитруси                         | 800-1000              | 4-6                   | В периоди на висока хранителна необходимост, в зависимост от фенологичния стадий на дървото. Подходящ за бедни почви или при неблагоприятни климатични условия.             |
| Десертно грозде                 | 500-1000              | 4-8                   | В периоди на висока хранителна необходимост, в зависимост от фенологичния стадий на културата. Подходящ за бедни почви или при неблагоприятни климатични условия.           |
| Костилкови                      | 500-1000              | 2-4                   | В периоди на повишена хранителна необходимост, в зависимост от фенологичния стадий на дърветата. Подходящ за бедни почви или при неблагоприятни климатични условия.         |
| Семкови                         | 500-1000              | 4-6                   | В периоди на повишена хранителна необходимост, в зависимост от фенологичния стадий на дърветата. Подходящ за бедни почви или при неблагоприятни климатични условия.         |
| Зеленчуци с кратък вегетационен | 500                   | 1-2                   | Първото приложение се препоръчва при разсаждане или в ранна фаза на развитие при директна сеитба. Повторно приложение се препоръчва след 30 дни, в зависимост от нуждите на |

| цикъл (<60 дни)                                      |                 |     | културата, характеристиките на почвата и преобладаващите климатични условия.                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зеленчуци със среден вегетационен цикъл (60–120 дни) | 500             | 2-4 | Първото приложение се препоръчва при разсаждане или в ранна фаза на развитие при директна сеитба. Повторното приложение се препоръчва след 30 дни, в зависимост от нуждите на културата, характеристиките на почвата и преобладаващите климатични условия. |
| Зеленчуци с дълъг вегетационен цикъл (>120 дни)      | 500             | 3-6 | Първото приложение се препоръчва при разсаждане или в ранна фаза на развитие при директна сеитба. Повторното приложение се препоръчва след 30 дни, в зависимост от нуждите на културата, характеристиките на почвата и преобладаващите климатични условия. |
| Полски култури                                       | 300<br>-<br>500 | 1-2 | През първите 45 дни след сеитба или разсаждане навременното приложение допринася за максимизиране на добива още от началните етапи на развитието на културата.                                                                                             |

\*Дозите са индикативни и трябва да се коригират според етапа на реколтата и растеж. Ако е необходимо, консултирайте се с вашия агроном.

## Внимание

Първо тествайте в малък мащаб, преди да промените нормата, начина на приложение или други параметри. Тъй като условията могат да се различават, а приложението на нашите продукти е извън нашия контрол, ICL не носи отговорност за неблагоприятни резултати. Свържете се с Вашия консултант на ICL за по-подробна информация и препоръки.

<https://icl-growingsolutions.com/bg-bg/agriculture/products/beoz-actirise/>

: 09/03/2026